

www.e-rara.ch

Histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique septentrionale

Vieillot, Louis Pierre

Paris, 1807

BPU Neuchâtel

Shelf Mark: ZX 3

Persistent Link: <http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-7221>

Explication des figures de la planche première.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

EXPLICATION

DES FIGURES DE LA PLANCHE PREMIÈRE.

CES Figures ont été faites avec la plus grande précision et réunies dans le même cadre, afin qu'on pût saisir, au premier coup-d'œil, les caractères du bec de plusieurs oiseaux, dont les uns sont présentés comme les types de nouveaux genres, et les autres sont transposés d'un genre connu à un autre, ou un peu dissemblables de leurs congénères par la forme de leurs mandibules. On voit aussi sur la même planche le bec de deux espèces seulement décrites dans cet ouvrage, parce qu'elles ressemblent totalement à deux autres qui y sont figurées, mais qui ont cette partie d'une conformation particulière.

- N° 1. Bec du Carouge à gorge noire, *Xanthornus nigricollis*, tome III. Cet oiseau a été donné par les auteurs pour un Merle, *Turdus ater*, LINN. GM., et pour un Troupiale, *Oriolus sparius*, ibid. Caractères du genre Carouge, indiqué par Buffon, et constitué par M. Lacepède : Bec grêle, arrondi, convexe, effilé, un peu arqué, entier et très-pointu.
- N° 2. Bec du Merle catbird, *Turdus felivox*, décrit dans le tome II, et placé par les auteurs parmi les Moucherolles, *Muscicapa Carolinensis*, LINN. GM.
- N° 3. Bec d'un Ortolan touit, *Hortulanus erythropthalmus*, tome IV. Les individus de cette espèce n'ont pas tous le bec de cette forme; d'autres, et c'est le plus grand nombre, l'ont semblable à celui du N° 6, si ce n'est qu'il est un peu recourbé à l'extrémité de sa partie supérieure.
- N° 4. Bec du Bruantin, *Icterus emberizoides*, DAUDIN, lequel diffère de celui de ses congénères en ce qu'il est en cône court et à bords recourbés en dedans. Cet oiseau a encore été donné par des auteurs pour un Pinson, *Fringilla peccoris*, LINN. GM. Voyez sa description, tome III.
- N° 5. Bec de la Fringille grivelée, *Fringilla iliaca*, tome III. Des Naturalistes ont rapporté cet oiseau au Bruant cul-rousset de Buffon, *Emberiza cinerea*, LINN. GM. Mais la forme de son bec suffit pour ne pas adopter une pareille réunion.
- N° 6. Bec de l'Ortolan à gorge blanche, *Hortulanus albicollis*, tome IV. Cet oiseau a été rangé par Gmelin avec les Pinsons, *Fringilla albicollis*, LINN. GM. Mais il a les mandibules à bords sinueux et recourbés en dedans, la supérieure plus large à sa base que l'inférieure et l'emboîtant. Caractères qui distinguent les Ortolans des Pinsons.
- N° 7. Bec du Viréon, *Vireo*, nouveau genre décrit dans ce volume. Les espèces qui le composent ont le bec garni à sa base de quelques poils, comprimé latéralement, entaillé et crochu à la pointe de sa partie supérieure, arrondi et recourbé en haut à l'extrémité de l'inférieure.
- N° 8. Bec du Carouge noir, *Xanthornus niger*, tom. III. Cet oiseau, qui est en double et triple emploi dans les ouvrages d'Ornithologie, a été présenté par les auteurs comme un Merle, *Turdus noveboracensis*, *labradorius*, LINN. GM., et comme un

EXPLICATION DE LA PLANCHE PREMIÈRE.

- Troupiale, *Oriolus ferrugineus*, *ibid.*; mais la forme de ses mandibules le place parmi les Carouges.
- N° 9. Bec de l'Ictérie, *Icteria*, lequel est garni à sa base de quelques soies divergentes, robuste, convexe, un peu arqué, entier et pointu. Ce nouveau genre est décrit dans ce volume.
- N° 10. Bec de la Fauvette verdâtre de Buffon. Cet oiseau, qui ressemble totalement au Viréon verdâtre, pl. 54 de ce volume, n'en diffère que par la conformation de ses mandibules.
- N° 11. Bec du Viréon verdâtre, *Vireo virescens*, figuré isolément sur cette planche, afin qu'en le comparant à celui de la Fauvette, N° 10, on puisse reconnoître plus facilement la différence qui existe entre eux.
- N° 12. Bec du Piranga incarnat, *Piranga rubra*. Cet oiseau que les auteurs ont rangé parmi les Tangaras, *Tanagra Mississipensis*, *æstiva*, LINN. GM., et d'autres parmi les Moucherolles, *Muscicapa rubra*, LINN. édit. 12, diffère assez des uns et des autres pour constituer un nouveau genre, dont le caractère principal est d'avoir le bec gros, alongé, droit, déprimé à sa base, convexe dessus et dessous, légèrement entaillé et recourbé à l'extrémité de sa partie supérieure.
- N° 13. Bec du Pinicole rouge, *Pinicola rubra*, gros, conico-convexe, entier, crochu à la pointe de sa partie supérieure, et tronqué à l'extrémité de l'inférieure. Le bec de cet oiseau ayant une forme très-dissimilable à celui de la Loxie ou du Grosbec, genre dans lequel les méthodistes l'ont placé, j'en ai fait le type d'un nouveau, décrit dans le tome III.
- N° 14. Bec de l'Ortolan à cou noir, *Hortulanus nigricollis*. Cette espèce a été décrite deux fois par Gmelin et placée dans deux genres séparés sous les noms de *Fringilla flavicollis*, et d'*Emberiza Americana*.
- N° 15. Bec du Pic noir à bec blanc, *Picus principalis*, de grandeur naturelle et vu en dessus; ce bec diffère de celui des autres Pics en ce que sa partie supérieure a deux canelures qui s'étendent sur toute sa longueur: chez quelques-uns, ces canelures ne vont qu'au tiers, et chez d'autres elles manquent totalement.
- N° 16. Bec du Tyran bentaveo, *Tyrannus bentaveo*, de grandeur naturelle et vu en dessus. Cet oiseau ne diffère du Tyran jaune, pl. 47 de ce volume, que par ses mandibules très-déprimées et dont la supérieure est en forme de cuiller renversée.

ERRATA.

Page 24, ligne 25, brun et noir, lisez du même noir.
 28, ligne 25, cou, lisez corps.
 35, ligne 21, ils, lisez elles.
 36, ligne 41, hawh, lisez hawk.

Page 40, ligne 24, falcon, lisez falco.
 44, ligne 35, et en, lisez et à.
 48, ligne 5, qu'ils, lisez qu'elles.
 65, ligne 35, pareilles, lisez pareils.

AVERTISSEMENT