

www.e-rara.ch

Histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique septentrionale

Vieillot, Louis Pierre

Paris, 1807

BPU Neuchâtel

Shelf Mark: ZX 3

Persistent Link: <http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-7221>

Buses.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelnformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

L'AIGLE AUX JOUES NOIRES, *Aquila Americana*.

A. noir; cou et poitrine d'un cendré sombre; bande noire sur les joues; tarsi laineux.

Falco Americanus, LINN. GM. Black-Cheeked eagle, LATH.

COMME ON TROUVE l'Aigle brun, *Falco fulvus*, et l'Aigle noir, *Falco melanaëtos*, aussi communément dans l'Amérique du nord qu'en Europe, et que l'Aigle aux joues noires a de grands rapports avec eux, ne se pourroit-il pas qu'il fût de la même espèce? C'est de ma part une conjecture appuyée sur l'examen d'un individu que j'ai rapporté des États-Unis. Cet Aigle participe des trois autres; car il a des plumes noirâtres, et des plumes brunes et grises; celles de la première couleur sont naissantes, ce qui semble indiquer le commencement de la mue; il a les joues noires: cette teinte est d'autant plus tranchante que la tête est d'un brun cendré sur toutes les autres parties. Si l'Aigle aux joues noires n'est pas un individu en mue de l'espèce de l'Aigle brun ou de l'Aigle noir, dans un âge plus ou moins avancé, il est aussi rare en Amérique que le précédent; mais je crois qu'il est en double emploi et qu'il ne forme point une espèce séparée. Au reste, cet oiseau a, selon les auteurs qui l'ont décrit sur une gravure de Robert, une bande noire à travers les joues; la tête, le cou, la poitrine d'un cendré obscur; le milieu du ventre noirâtre; le dos, les ailes et la queue noires; les tarsi recouverts de plumes jusqu'aux doigts; le bec blanc; la cire et les doigts jaunes; la taille de l'Aigle brun. On le trouve dans le nord de l'Amérique.

Je n'ai point rencontré de vrais Faucons dans l'Amérique septentrionale, c'est-à-dire des carnivores indigènes au pays qui aient, comme notre Faucon, *Falco communis*, LINN. GM., le bec denté vers le bout de sa partie supérieure; la première plume de l'aile longue et terminée en forme de tranchant; la deuxième, la plus longue de toutes, caractères qui le distinguent très-bien de la Buse, avec laquelle on l'a confondu sous le même nom de *Falco*. Si l'on consulte les habitudes, l'instinct et les mœurs de ce Faucon, on voit qu'il présente encore des différences plus essentielles.

BUSES.

CARACTÈRES: Bec couvert à sa base d'une membrane cériforme, courbé dès son origine, dilaté sur les bords de sa partie supérieure et crochu à sa pointe; mandibule inférieure droite et tronquée à son extrémité; première plume de l'aile courte; quatrième et cinquième les plus longues de toutes; tarsi gros et courts; quatre doigts, trois devant, un derrière, antérieurs unis à leur base par une petite membrane.

LA BUSE BRUNE, *Buteo fuscus*.

Pl. 5.

B. brune sur la tête et le manteau; noirâtre sur le dessus du cou; couvertures des ailes et plumes secondaires variées de blanc sombre, de brun et de roussâtre; partie inférieures d'un gris sale, tacheté de brun; couvertures supérieures de la queue d'un blanc terne et rayées de noir; plumes couleur de rouille pâle et rayées de brun au travers.

LES Buses de l'Amérique septentrionale ont le même genre de vie et le même instinct que celles d'Europe. Elles fréquentent de préférence les lieux habités et nichent sur les arbres à une moyenne hauteur. Elles préfèrent les plaines aux montagnes et sur-tout les terres giboyeuses. Ces rapaces, d'une stupidité féroce, se laissent approcher de très-près. Ils se nourrissent de petits quadrupèdes, d'oiseaux et de reptiles. Ainsi que les éperviers et les cresserelles, la plupart des Buses accompagnent les oiseaux voyageurs

dans leurs courses périodiques, certaines de trouver parmi eux une proie aisée à saisir et toujours abondante. Celles qui n'émigrent point en hiver se tiennent pendant cette saison près des habitations rurales, où elles font une guerre cruelle à la volaille. Leur ponte est ordinairement de quatre œufs, et leurs petits, ainsi que ceux des précédents, éclosent couverts de duvet et mangent seuls dès leur naissance.

Quoique la liste des oiseaux carnivores de l'Amérique septentrionale soit très-nombreuse dans les Ornithologies modernes, je n'ai pu déterminer à quelle espèce la Buse brune appartient. Cependant j'ai peine à croire qu'elle ne soit pas connue; mais les couleurs et leur distribution présentant toujours des différences à chaque mue que ces oiseaux éprouvent pendant leur vie, les individus d'une même espèce et d'un âge égal n'ayant pas quelquefois un plumage semblable, il en résulte qu'en les comparant en nature aux descriptions déjà faites, il est très-rare de trouver une analogie complète. Je me bornerai donc à décrire cette Buse et plusieurs autres rapaces tels que je les ai sous les yeux; et si je trouve sur leur vêtement des rapports avec celui d'une espèce de leur genre, je la citerai sans néanmoins assurer son identité: autrement, je les laisserai isolés.

La Buse de cet article a le bec noir; la cire bleuâtre; les plumes de la tête brunes et fauves; celles du dessus du cou brunes et noirâtres; cette dernière couleur est uniforme sur le dos et le croupion, et présente des taches transversales sur les couvertures des ailes et sur les plumes secondaires, dont le fond est roussâtre. Un gris sale, tacheté de brun, règne sur toutes les parties inférieures; les plumes caudales sont d'une couleur de rouille pâle et rayée de brun en travers; les plumes qui les recouvrent en dessus ont des taches noires et sont d'un blanc terne, ainsi que les jambes; les pieds sont jaunes, et les ongles noirs; la queue est arrondie à son extrémité. Longueur totale, dix-sept pouces et demi.

De ma collection.

LA BUSE A QUEUE FERRUGINEUSE, *Buteo ferruginicaudus*. Pl. 6.

B. brune en dessus; d'une nuance plus claire sur la tête, plus foncée sur le manteau; plumes des ailes d'un cendré sombre et barrées de noir; parties inférieures légèrement tachetées de brun sur un fond blanc; queue d'un gris ferrugineux pâle et rayée de noir.

CETTE Buse a le bec noir; le devant des yeux garni de longues soies divergentes; la cire jaune; l'iris d'un brun jaunâtre; les plumes de la tête et de la nuque brunes et marquées de blanc à l'intérieur; celles du cou, du dos et des couvertures des ailes d'un brun noirâtre dans le milieu et clair sur les bords; les plumes des ailes d'un cendré foncé et variées de bandes transversales noires; le dessous du corps tacheté de brun sur un fond blanc; ces taches ne sont que très-peu apparentes sur les côtés, qui sont brunâtres; la queue est d'un gris ferrugineux pâle, marquée de sept raies transversales noirâtres, et terminée de blanc; les plumes des jambes sont variées de brun; les pieds couleur de soufre; et les ongles noirâtres. Longueur totale, dix-neuf pouces environ.

Je dois la connoissance de cet oiseau à M. Bosc, qui se l'est procuré à la Caroline du Sud. Ce savant, très-zélé pour les progrès de l'Histoire naturelle, s'est fait un plaisir de me l'offrir, pour le faire dessiner, ainsi que tous les oiseaux qu'il possède et que je n'ai point rencontrés dans le nord des États-Unis.

LA BUSE GALLINIVORE, *Buteo gallinivorus*.

B. variée de blanc sale et de brun en dessus; d'un blanc légèrement nuancé de jaune en dessous.

LES Américains donnent à cet oiseau le nom de *great hen hawk* (grand Épervier des Poules), pour le distinguer d'un autre plus petit, qui fait la chasse aux Poulets. Il se rapproche du Faucon par sa manière de chasser, par la grosseur et la force de ses tarses et de ses ongles : c'est le seul rapport qu'il y ait entre ces deux carnivores. Cette Buse fréquente les lieux habités, et détruit beaucoup de volailles : elle fait aussi la guerre aux Corneilles, mais elle ne les attaque que lorsqu'elles sont seules. Ce rapace en prend rarement, car dès qu'une Corneille l'aperçoit, elle indique aux autres, par des cris réitérés, la présence de leur ennemi; alors toutes se réunissent, se mettent à sa poursuite, et le harcèlent au point qu'il est forcé de s'enfuir. L'audace et la voracité de cette Buse redoublent pendant l'hiver; elle se met dès le point du jour en embuscade près des demeures rurales, fond sur la première Poule qui sort de son gîte, et détruit en peu de temps tout un poulailier : le Coq même, qu'elle n'ose combattre dans les autres saisons, devient aussi, malgré sa force et son courage, la victime de son attachement pour ses compagnes. L'abondance d'alimens que cet oiseau trouve pendant l'été dans les plaines et les bois, le rend alors plus méfiant; il s'écarte des lieux habités, et il se retire dans les forêts. Il place son nid sur les arbres, à la bifurcation des grosses branches, et le construit avec des buchettes, des tiges d'herbe et des racines chevelues. Sa ponte est de quatre ou cinq œufs blancs et tachetés de roux.

Cette espèce a le bec couleur de plomb, et noir à la pointe; la cire et l'iris jaune; la tête et le cou variés de brun et de blanc sale; le dos, le croupion, et les petites couvertures des ailes d'un brun plus foncé; les moyennes et les grandes variées de blanc; les trois premières pennes noires, les autres marquées de blanc en dehors, et de brun en dedans; la gorge, le devant du cou, et toutes les parties postérieures, d'un blanc jaunâtre, avec quelques taches oblongues d'un brun clair, plus étendues et plus grandes sur le ventre. Les plumes des jambes, longues, blanches et irrégulièrement tachetées; la queue rayée de brun et de blanc; les pieds jaunes. Elle a dix-huit pouces environ de longueur totale. Les ailes pliées vont jusqu'à l'extrémité de la queue. Peu d'individus de cette espèce se ressemblent entièrement; sur les uns la teinte brune est dominante; sur d'autres, c'est la couleur blanche ou jaunâtre.

LA BUSE CENDRÉE, *Buteo cinereus*.

B. d'un brun cendré en dessus; blanche et tachetée de brun en dessous; bande d'une teinte sombre sur les joues et les côtés du cou; pieds en partie couverts de plumes; bec et cire d'un cendré bleuâtre.

Falco cinereus, LINN. GM. Ash-coloured Falcon, LATH.

CETTE Buse, dont Edwards a publié la figure pl. 53, se trouve à la baie d'Hudson, où elle fait la chasse aux Lagopèdes et aux Gélinites. Elle a le dessus de la tête et du cou blanc et tacheté de brun; une raie d'une teinte sombre au-dessous des yeux, laquelle passe sur les joues et se perd sur les côtés du cou; le dessus du corps d'un brun cendré sur le milieu de la plume, et d'une nuance plus claire sur les bords; les petites couvertures des ailes bordées de blanc; la première plume tachetée de la même couleur, et les autres cendrées en dessus; les parties inférieures du corps blanches et variées de taches brunes, oblongues sur la poitrine, rondes et irrégulières sur les flancs, et longitudinales

sur les plumes des jambes ; les couvertures inférieures de la queue rayées transversalement de blanc et de noir ; le dessus des plumes pareil au dos, et croisé de lignes étroites de couleur d'argile ; ces lignes sont blanches en dessous ; le bec, la cire et les pieds dans la partie qui n'est pas couverte de plumes, sont d'un cendré bleuâtre, et les ongles noirs. Taille d'une Poule moyenne.

LA BUSE ROUGEÂTRE, *Buteo spadiceus*.

B. d'un rouge brun et ferrugineuse en dessus ; cendrée et d'un brun bai en dessous ; premières plumes de l'aile blanches ; queue d'un brun foncé ; tarsi couverts de plumes jusqu'aux doigts.

Falco spadiceus, LINN. GM. Placentia Falcon, LATH.

CET oiseau de rapine se trouve à la baie d'Hudson et à Terre-Neuve. Il se nourrit principalement de Canards, et les prend au moment où ils s'envolent. Il a le bec noir, la cire jaune, les plumes de la tête brunes et bordées d'un rougeâtre clair ; le dessus du cou, le dos et les couvertures des ailes de cette teinte, et variés de ferrugineux ; le dessous du corps d'un brun-bai foncé, barré de blanc sur la poitrine, nuancé de cendré sur le ventre, et rayé de brun sur les plumes des jambes et des pieds ; les plumes des ailes de cette dernière couleur ; les cinq premières d'un blanc pur dans les deux tiers de leur longueur ; les couvertures supérieures de la queue blanches et terminées de brun-bai ; les plumes d'un blanc jaunâtre à leur origine, et ensuite brunes ; les doigts d'un jaune verdâtre ; les ongles noirs et très-crochus. Longueur totale, dix-huit pouces. On pourroit rapporter à cette Buse le Saint-John's Falcon et le Newfoundland f. de Latham. *Falco S. Johannis*, *Fal. novæ terræ*, LINN. GM., quoique ces auteurs les donnent pour des espèces distinctes ; car ces deux oiseaux n'en diffèrent guère que par la nuance et la distribution des couleurs. Ils ont à-peu-près la même taille, le même ensemble et leurs pieds sont emplumés, courts et forts. Ils habitent les mêmes contrées, et ils font la chasse aux mêmes animaux. Cette conformité dans la physionomie, les habitudes, le genre de vie et la nourriture de choix, me paroît être une grande présomption d'identité d'espèce. On pourroit encore d'après les mêmes motifs, rapprocher de ces Buses le Faucon pattu de Brisson, *Falco pennatus*, LINN. GM.

LA BUSE FAUVE, *Buteo fulvus*.

B. fauve ; variée de brun sur le dos, les ailes et la queue.

Falco Jamaïcensis, LINN. GM. Cream-coloured Falcon, LATH.

CETTE jolie Buse habite les grandes Isles Antilles, et particulièrement Saint-Domingue et la Jamaïque, où elle se tient sur les montagnes. Elle a le bec noir, la cire jaune, le plumage généralement d'un fauve brunâtre, plus pâle sur les parties inférieures. Cette teinte est uniforme sur la tête, variée de brun sur le milieu et sur les bords des plumes du dos ; les grandes couvertures des ailes sont rayées de brun ; les plumes primaires d'un fauve très-foncé, tendant au brun près de la tige ; le ventre et les côtés irrégulièrement tachetés de cette dernière couleur ; les plumes des jambes d'un fauve très-clair, avec quelques raies longitudinales d'un brun pâle ; la queue est pareille au dos, et traversée par de petites bandes, très-peu apparentes ; les pieds sont courts, robustes et jaunes ; les ongles noirs. Longueur totale, dix-huit à dix-neuf pouces.