

www.e-rara.ch

Histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique septentrionale

Vieillot, Louis Pierre

Paris, 1807

BPU Neuchâtel

Shelf Mark: ZX 3

Persistent Link: <http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-7221>

Busards.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

BUSARDS.

CARACTÈRES : Bec couvert à sa base d'une membrane cériforme, courbé dès son origine, dilaté sur les bords de sa partie supérieure et crochu à sa pointe; mandibule inférieure plus courte et tronquée à son extrémité; première penne de l'aile courte, quatrième et cinquième les plus longues de toutes; tarsi longs et grêles; quatre doigts, trois devant, un derrière, antérieurs unis à leur base par une petite membrane.

LE BUSARD D'HIVER, *Circus hyemalis*.

Pl. 7.

B. brun et ferrugineux en dessus; varié de noir, de blanc et de jaunâtre en dessous; penes primaires noires; queue de même couleur et croisée de blanc. *Mâle*. Tête, gorge et parties postérieures blanches et brunes; taches ovales et en forme de cœur sur les flancs; manteau brun et ferrugineux; penes des ailes brunes en dessus et blanches en dessous; queue brune. *Femelle*.

Falco hyemalis, LINN. GM. Northern Falcon, LATH.

LES espèces de ce genre ont, comme on le voit, les plus grands rapports avec celles du précédent; mais elles ont les pieds plus minces et plus longs, la tête moins grosse, la taille plus svelte, et un ensemble difficile à indiquer, et qu'on saisit néanmoins facilement, quand on les voit en nature. Les Soubuses ne diffèrent des Busards que par une sorte de collerette, très-peu apparente dans les mâles, et par leur taille ordinairement plus petite, je n'ai pas dû les séparer.

Les Busards se posent rarement à la cime des arbres; il se tiennent ordinairement dans les endroits marécageux, sur les arbrisseaux ou dans les buissons et les broussailles, pour surprendre les grenouilles, les lézards et divers reptiles dont ils se nourrissent de préférence aux autres animaux. Les Soubuses fréquentent plus volontiers les campagnes et les bois, où ils donnent la chasse aux petits quadrupèdes et aux oiseaux; ces dernières nichent sur les arbres, et les premiers dans les marais. Leur ponte est de quatre ou cinq œufs; leurs petits mangent seuls dès leur naissance, comme ceux de tous les oiseaux rapaces, à l'exception des Vautours. Le Busard d'hiver se trouve à New-Yorck, ainsi qu'à la Caroline; il arrive dans cette dernière contrée au mois de novembre, et il en part au mois de mars. On le rencontre dans les forêts marécageuses, où il vit d'écureuils à défaut de reptiles. Il s'approche quelquefois des maisons rurales, et jette l'épouvante parmi les paisibles habitans des basse-cours, par un cri aussi fort que celui de la Buse gallinivore.

Le mâle a le bec noirâtre, avec quelques poils à sa base; la cire orangée; l'iris noisette; les paupières bordées de jaune; le dessus de la tête et le manteau bruns et ferrugineux; les petites couvertures des ailes rougeâtres et noires; les autres brunes et tachetées de blanc; les primaires noires; les secondaires pareilles aux grandes couvertures; les plumes du croupion terminées et rayées de blanc en travers, sur un fond brun; le devant du cou jaunâtre, avec des raies noires longitudinales: ces deux teintes dominant aussi sur les parties postérieures; mais les raies sont moins larges sur la poitrine et sur le ventre, dont les plumes ont des taches blanches à leur origine et à leur extrémité: le bas-ventre est de cette dernière couleur, ainsi que les couvertures inférieures de la queue; les penes sont noires en dessus, avec cinq bandes transversales blanches, dont une les termine; ces penes sont grises en dessous, et les bandes comme effacées; les jambes sont ferrugineuses, les pieds orangés et les ongles noirâtres. Longueur totale, seize à dix-sept pouces.

La femelle a les plumes de la tête et du dessus du cou blanches et brunes à leur

extrémité; la gorge et les parties postérieures pareilles à la tête; mais la teinte brune domine plus que l'autre; le dos et le croupion comme le mâle; le ventre blanc et varié de taches brunes, étroites et longitudinales; les flancs de cette dernière couleur, avec des marques blanches, ovales, et en forme de cœur; les jambes d'un blanc pur; les scapulaires et les ailes brunes et bordées de ferrugineux; les petites couvertures alaires pareilles à celles du mâle; les autres ont moins de blanc; les plumes alaires, blanches en dessous; celles de la queue brunes sur le côté interne vers le bout, et rayées d'une nuance plus foncée.

De la collection de M. Bosc.

LE BUSARD A CROUPION BLANC, *Circus europogistus*. Pl. 8.

B. à tête variée de ferrugineux et de brun; joues et cou cendrés; ailes et queue de cette couleur et noires; croupion d'un blanc pur; dessous du corps d'un gris blanc et tacheté de ferrugineux.

Falco europogistus, DAUD.

CET oiseau de proie a le bec brun, et garni de soies à sa base; la cire verdâtre; l'iris jaune; les plumes de la tête d'un ferrugineux clair sur les bords et d'un brun foible dans le milieu: cette dernière teinte est plus foncée sur l'occiput; les joues sont d'un cendré pâle, ainsi que le dessus du cou, dont les plumes sont brunes dans le milieu et ferrugineuses sur les bords; le haut de la gorge est d'un gris blanc, de même que les parties postérieures, qui sont en outre variées de taches ferrugineuses et en forme de cœur; les couvertures supérieures de la queue sont blanches, et les inférieures marquées de bandes brunes sur un fond blanchâtre; le dessus des plumes est d'un cendré rembruni, avec quatre raies larges, transversales et d'un brun foncé; les couvertures supérieures des ailes sont grises; les inférieures blanches, les plumes primaires cendrées et noires; les pieds jaunes. Longueur totale seize pouces et demi. Ce Busard est rare à la Caroline, et ne se trouve qu'en hiver dans les lieux habités.

De la collection de M. Bosc.

LE BUSARD ROUX, *Circus hudsonius*. Pl. 9.

B. brun sur les parties supérieures; roux sur les inférieures; bande circulaire brune et grise sur les côtés de la tête; ailes d'un gris ardoisé; queue rayée de noirâtre en dessus et d'un blanc sale en dessous.

Falco hudsonius, LINN. GM. Hudson's bay ringtail, LATH.

CETTE espèce, qui est répandue dans l'Amérique septentrionale, depuis les Florides jusqu'à la baie d'Hudson, porte un plumage assez analogue à celui de la Soubuse d'Europe, *Falco pygargus*, LINN. GM. Elle a le bec noir; la cire, l'iris et les pieds jaunes; le dessus de la tête et du corps brun; cette teinte est plus claire sur la première partie; la collerette est grise dans le milieu et brune à son extrémité; les couvertures des ailes sont pareilles à la tête et bordées en dehors d'un brun roux; les plumes d'un gris ardoisé foncé avec des bandes transversales noires; les deux plumes du milieu de la queue brunes et rayées en travers de noirâtre, ainsi que les latérales, dont le fond est d'un cendré bleuâtre; toutes sont en dessous d'un blanc sale avec des bandes effacées; la gorge et les parties inférieures sont rousses et tachetées de brun; les ongles noirs. Longueur totale, dix-huit pouces.

Quoique le Ringtail hawk d'Edwards, pl. 107, diffère du précédent en ce que sa collerette n'est que très-peu apparente et que les taches sont plus nombreuses sur les parties inférieures; on ne peut donner ces oiseaux pour deux espèces distinctes, puis-

qu'ils se ressemblent d'ailleurs et qu'ils habitent les mêmes contrées. L'un me paroît être le mâle et l'autre la femelle.

De la collection de M. Bosc.

LE BUSARD DES MARAIS, *Circus uliginosus*.

B. brun en dessus et sur la poitrine ; d'un jaune rougeâtre sur le ventre ; queue rayée en travers de noirâtre.

Falco uliginosus, LINN. GM. Marsh hawk, LATH.

CETTE espèce se tient dans les lieux marécageux, où elle donne la chasse aux reptiles et aux petits oiseaux. Lorsque le froid engourdit les premiers et force les autres de se retirer dans le sud, elle quitte le nord des États-Unis pour chercher sa nourriture dans les pays méridionaux. C'est à cette seule époque qu'on la rencontre aux Florides et aux grandes Isles Antilles. Elle a le bec bleuâtre, la cire et l'orbite de l'œil d'un rouge orangé ; l'iris couleur de noisette ; deux raies sur les côtés de la tête, l'une blanche et l'autre d'un noir changeant en bleu. La première part de l'angle du bec, entoure et s'étend au-delà des yeux ; la seconde naît à la base de la mandibule inférieure, passe immédiatement sous l'œil, forme sur les joues une sorte de collerette, et un collier sur le haut de la gorge. La tête, le manteau et la poitrine, sont d'un brun foncé, tacheté de blanc sombre sur le sinciput ; la queue est rayée de noirâtre en travers ; ses couvertures supérieures et le croupion sont blancs ; le ventre est d'un jaune rougeâtre ; les pieds sont d'un rouge orangé. Longueur totale, vingt-deux pouces.

LE BUSARD VARIÉ, *Circus variiegatus*.

B. à tête et dessus du cou blanchâtres et marqués de rougeâtre ; dos brun ; ailes noirâtres ; parties inférieures d'un blanc sale et tachetées de brun ; queue à bandes transversales, effacées. *Mâle*. Bandes de la queue plus apparentes et variées de points blancs. *Femelle*.

Falco variiegatus ; *F. albidus*, LINN. GM. Speckled Buzzard, LATH.

ON trouve cet oiseau dans diverses contrées de l'Amérique septentrionale. Le mâle a le bec d'un brun noirâtre ; la tête, le cou et les scapulaires blanchâtres, et marqués irrégulièrement d'un brun rougeâtre sur le milieu de la plume ; le dos brun, les couvertures supérieures des ailes tachetées de blanc ; les pennes noirâtres ; la queue d'un brun foncé, avec quelques bandes transversales, presque effacées ; les parties inférieures blanches, avec des taches brunes, plus grandes et plus espacées sur la poitrine et le ventre ; ces taches disparaissent totalement vers l'anus ; les pieds sont jaunes et les ongles noirs. Longueur totale, douze pouces. La femelle, que Pennant a donnée mal à propos pour une espèce particulière sous le nom de Buzzardet, et Gmelin sous celui de *Falco albidus*, diffère du mâle en ce qu'elle est plus grande de trois pouces, et en ce que sa queue a des bandes plus apparentes, et des points blancs.