

**www.e-rara.ch**

## **Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis**

Sistens Lauraceas, Begoniaceas, Datisceas, Papayaceas, Aristolochiaceas et Stackhousiaceas

**Candolle, Alphonse de  
Parisiis, MDCCCLXIV. [1864]**

**ETH-Bibliothek Zürich**

Shelf Mark: Rar 30893: 15/1

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-71988>

Addenda et corrigenda.

---

### **www.e-rara.ch**

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

---

**Nutzungsbedingungen** Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelnformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

**Terms of Use** This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

**Conditions d'utilisation** Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

**Condizioni di utilizzo** Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

## ADDENDA ET CORRIGENDA.

### LAURACEÆ (1).

- P. 3, lin. 24, *pro* differentiæ *lege* differentias
- P. 4, lin. ult., *pro* Apollonia *lege* Apollonias
- P. 4, lin. penultima (in nota), *pro* 5-7-nervio *lege* 5-7-nervia
- P. 9, in citat. *Cinnamomi*, lin. 4 deleatur 292, et ad calcem synonymorum *adde* : Lauri (plerique *Cinnamomi*) species Blanco Fl. Filipin. ed. 1, p. 315, nimis imperfecte descriptæ, sunt inextricabiles, nempe : L. Culilaban p. 315, L. Cassia et Martincensis p. 317, L. lanosa p. 318, et L. *Cinnamomum* p. 319. — L. serrata Blanco p. 319, propter folia serrata certe non est Lauracea.
- P. 10, lin. 33, *pro* Arnb. *lege* Amb.
- P. 13, n. 10, lin. 3, *pro* levibus *lege* lævibus
- P. 13, n. 10, α, *adde* Herb. Amat. t. 334.
- P. 14, n. 10, ε, *adde* : Circa Para, Brasil. æquat. legit ill. Mart.! (hb. Monac.).
- P. 15, n. 14, lin. 6, *pro* consistantia *lege* consistentia
- P. 16, n. 15. C. PEDUNCULATUM Nees, *adde* syn. : C. Kiamis Hassk. cat. h. Bogor. 1844, p. 87, cum synon. C. Japonicum et sericeum Siebold in Act. Bat. 12, p. 23, 24. Laurus sericea Bl. Bydr. p. 554 (cfr. infra n. 35).
- P. 17, n. 17, γ, *adde* : Laurus Pseudo-Cassia (auct. ign.) hb. Zuccar.! specim. Javan. a cl. Siebold lect.
- P. 17, n. 18, lin. 11, *pro* foliosum *lege* foliorum.
- P. 17, n. 10. C. PAUCIFLORUM, β *Taxia*. Huc referenda videtur planta a Griffith. lecta, foliorum acumine angusto 6-10 lin. longo acuto insignis, in hb. Zuccar.
- P. 18, n. 19. C. TAMALA N. β *albiflorum*, est C. Reinwardti hort. Petrop. fide hb. DC.
- P. 18, n. 20. C. SIEBOLDI, *adde* synon. : C. Cassia Siebold in Act. Batav. cum syn. C. dulce Nees, G. Chinense Bl. Nikkei japonensium, fide hb. Zuccar.
- P. 18, n. 21. C. SULPHURATUM Nees. Formam grandifoliam, fol. pede longioribus e basi acutâ elliptico-oblongis acuminatis inter indumentum subtus cæsioglaucis supra lucidis in nervis hirtellis, e Sumatræ orient. prov. Palembang, indicat cl. Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 358.
- P. 19, 22, lin. 8, *pro* longæ *lege* longo
- P. 20, n. 26, lin. 5, *pro* foliorum, forma *lege* foliorum forma,
- P. 20, n. 26, β *trinerve*. Cinn. eucalyptoides Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 358? In Sumatra austr. et occid.
- P. 20, n. 26, δ? *dubium*. Calyx fruct. infundibularis, in pedicellum 1-2 lin. longum attenuatus, lobis ovatis acutiusculis obsolete 1-nerviis diu persistentibus, demum imâ basi rumpentibus. Baccæ oblongo-ovalis, 5-6 lin. longa utrinque obtusa, ex specim. Thwait. n. 2282! in hb. DC.
- P. 20, n. 26. C. CALYCVLATUM (Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 359), ramulis subcompressis cum petiolis foliis jun. subtus paniculisque albido-pubescentibus, foliis suboppositis pergamaceis e basi latâ subrotundatâ vel acutâ ovato- vel elliptico-oblongis vel rarius sublanceolatis attenuato-subacuminatis tri- vel triplinerviis, demum transverse venulosis, supra lucidis, subtus glaucis, cupulæ lobis persistentibus coriaceis ovatis acutis utrinque adpresse pilosis. ♂ In Sumatræ occid. prov. Priaman. — Folia distincte petiolata, 7-3½ poll. longa, 2½-3½ poll. lata, nervis lateralibus acuminis basin attingentibus. Paniculæ terminales, oppositè ramosæ. Baccæ oblongæ, pollicares. Foliis C. eucalyptoidi (cfr. C. iners β, trinerve, nob.) simile, fructu vero distinctissima et ad C. Lampongum accedere dicitur.

- P. 20, n. 26\*\*. C. LAMPONGUM (Miq. l. c. p. 358), ramulis 4-gonis cum petioliis foliis novellis paniculisque subpatulo-puberis, foliis suboppositis pergamaeis o basi acutâ nervoso-marginatâ lanceolato-oblongis acuminatis ad acuminis basin usque trinerviis demum transverse venosis, supra lucidis, subtus glaucis, paniculæ axi angulato, cupulæ lobis persistentibus ovatis utrinque adpresse velutinis  $\frac{5}{8}$  In Sumatræ austr. prov. Lampong (Teysmann.). Ramuli, petioli et nervi seniores in sicco fusco-rubelli. Folia 6-3-poll., 2 poll. lata, venis ante marginem junctis. Paniculæ terminales, pyramidatæ. Baccae ellipsoideæ. De affinitate nil traditur, sed plerisque notis cum præcedente convenit.
- P. 21, n. 29, lin. 2, pro triplo- lege tripli-
- P. 22, n. 35. C. DAPHNOIDES S. et Z. adde synonym.: Laurus sericeus Bl. fide hb. Zuccar. (cfr. supra addenda ad p. 16, n. 15 et p. 258, n. 6).
- P. 22, n. 36. C. PERROTTETII, adde: in Indiâ or. (loco non indicato) legit L. B. de Hügel, fide specim. in hb. Zuccar., cui folia subtus vel utrinque minute areolata vel punctata, juniora crebre transverso-venosa. Cæt. exacte ut in typo.
- P. 24, n. 44. C. CAMPHORA Nees. E Japoniâ retulit cl. Siebold! (hb. Zuccar.).
- P. 24, n. 44, lin. 17 (alibique infra) pro concoloria lege concolora
- P. 24, n. 44,  $\gamma$ , pro nomine var. rotundata lege rotundatum
- P. 25, n. 45,  $\delta$ , pro cuneata lege cuneatum
- P. 25, n. 47,  $\beta$ , pro caniflora lege caniflorum
- P. 26, n. 49, lin. 6, pro inodore lege inodoro
- P. 26, n. 52. C. PARTHENOXYLON, adde: in Sumatrâ austr. et Bangkâ, ex Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 359.
- P. 27, n. 53. C. PSEUDO-SASSAFRAS, adde: folia adulta interdum subtus haud glauca. In Sumatrâ occid. Miq. l. c. p. 359. — var. imperforata (Miq. ibid.) fol. subtus ad axillas haud perforatis, calycis lobis intus undique pubescentibus. Ad Padang. (Teysmann.)
- P. 29, n. 1, lin. 6, pro 6-10 poll. lege 6-10 lin.
- P. 31, n. 7,  $\alpha$ . Cfr. supra p. 164 et 164 Nect. membranacea et patens Gris., et adde synonym.: Laurus nutans Isert, ex Stendel.
- P. 32, n. 9  $\beta$ , lin. 4, pro incolar. lege incolarum.
- P. 33, n. 13, lin. 8 pro forcatis lege foveatis.
- P. 35, ante  $\frac{2}{2}$  adde: n. 23\* PHEBE LAMPONGA (Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 359.),  $\frac{1}{2}$  glabra, foliis pergamaeis e basi acutâ v. cuneatâ obverse elliptico-oblongis v. sublanceolatis breviter obtuseque acuminatis v. apiculatis subtus tenere costatis glaucescentibus?, paniculis axillaribus folia vix æquantibus paucifloris, pedicellis fructif. parum incrassatis.  $\frac{5}{8}$  In Sumatræ austr. prov. Lampong (Teysm.). Ramuli tenues, angulati, glabri, gemmis parce pilosulis. Folia glabra v. subglabra, sicca fusciscentia, 4-2 poll. longa, petiolo 4-6 lin. longo, costis utrinsecus 6-9 subobsoletis. Paniculæ demum glabræ. Calyx fructifer 6-partitus, lobis oblongo-linearibus. Baccae globosæ, magn. pisi. De affinitate nil traditur.
- P. 36, n. 28. PHEBE CUNEATA Bl. adde synonym.: Machilus cuneata Hassk. cat. h. Bogor. 1844, p. 88.
- P. 39. MACHILUS. — Novæ sp. 2 indicantur a cl. Hance in Ann. sc. nat. ser. 4, vol. 18, p. 226 seq. (anno 1863 divulg.):
- 1\* M. GRIJSII (Hance, l. c.), arborescens, gemmis velutinis, ramulis velutino-tomentosis, foliis e basi rotundatâ obovato-oblongis apice cuneato-attenuatis costato-venosis ( $3\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$  poll. longis,  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. latis, petiolo 3-7 lin. longo) supra glaberrimis subtus dense cinnamomeo-velutinis, venis subtus prominulis, racemis longius pedunculatis laxis umbellato-subcorymbosis, floribus sericeis.  $\frac{5}{8}$  In Chinæ prov. Fokien (de Grijs). Hance hb. propr. n. 6788. Proxima M. velutinæ Champ. quæ differt foliis basi cuneatis, racemis brevibus densifloris, etc.
- 7\*\* M. OREOPHILA (Hance, l. c. p. 227), arborescens, perulis velutinis margine glabris, ramulis ochraceo-tomentosis, foliis elongato-lanceolatis utrinque attenuatis (5-7-poll., 4- $1\frac{1}{2}$  poll. latis, petiolo subpollicari) supra glabris, subtus glau-

cescentibus et præsertim secus venas vix elevatas sparse pilosulis, racemis longius pedunculatis laxis subumbellatis apice dense multifloris, floribus cano-sericeis. ♂ In Chinæ prov. Fokien (de Grijs). Hance, hb. propr. n. 6789. — Maxime affinis nobis videtur M. Tavoyane.

P. 40, n. 5, lin. 2. *pro acute lege acutâ.*

P. 41, n. 6, lin. ultima, *pro indentico lege identica.*

P. 41, ante n. 6, inseratur :

n. 5\*. *MACHILUS PARVIFLORA*, foliis coriaceo-chartaceis e basi attenuatâ acutâ lanceolatis oblongisque acuminatis glabris, subtus glaucis, supra v. utrinque minute reticulatis v. leviter scrobiculatis, paniculis folio brevioribus glabriusculis. ♂? In Khasya, alt. 4-5000 ped. Machilus 4 et 9. Hook. fil. et Thoms. ! Herb. Ind. or. — Præter notas indicatas omnia M. odoratissimæ, sed flores constanter minores ( $1\frac{1}{2}$  lin. longi) cum pedicellis glabri v. minute parceque puberuli. Bacca (immatura) oblonga, 7 lin. longa. (v. s.)

β, *scrobiculata*, foliis coriaceis oblongis subacuminatis obtusisque supra minuto scrobiculatis, reticulo supra prominulo, subtus teneriore subtili subimmerso v. obsoleto, paniculis folia superantibus (3-4-poll.). (Cæt. ut in typo.) ♂? In Indiâ or. loco non indicato (Griff.!). Calyx demum 2 lin. longus subindurescens, — an igitur potius Phœbes sp.? (v. s. in hb. Zuccar.)

γ? *platyphylla*, foliis chartaceis oblongo-ellipticis rotundato-obtusis (6-8-poll., 2-3 $\frac{1}{2}$  poll. latis) subtus tenere laxèque subprominulo-venosis, reti exiguo immerso v. subtus oblitterato, paniculis folia subæquantibus (4-6-poll.) gracilibus supra medium laxè ramosis. (Cæt. ut in typo.) ♂? In Indiâ orient. loco non indicato (L. B. de Hügel!). Accedit ad M. odoratissimæ var. η latifoliam Miq., sed floribus minoribus glabris v. vix puberulis distincta. (v. s. in hb. Zuccar.)

P. 44, n. 2. Deleatur β *lanceolata*, quæ identica cum P. punctata, p. 50, n. 28.

P. 45, n. 6, lin. 3, *pro venis lege venisque.*

P. 47, n. 15, lin. 3, *lege Ouropreto, et adde :*

β? *verbascifolia*, foliis e basi rotundatâ oblongo-ovatis acutis, costis semipaten-tibus supra immersis obsoletis subtus vix prominulis, reticulo supra densissimo impresso v. immerso subtus laxiore demum leviter prominulo. ♂? Circa Cachapoyas Peruvicæ (Matthews!). Ramuli fuscii, glabri, apice cum innovat. paniculis et fol. subtus cano-tomentelli. Folia supra subnitida, 2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 12-14 lin. lata, petiolo 3 lin. supra plano, reticulo supra demum oblitterato. Paniculæ axillares, racemiformes? laxæ, demum glabrescentes, floribus (nondum explicat.) pedicellum bracteamque oblongam æquantibus, racemis fructiferis 3-4-poll. glabris, pedicellis 3 lin. longis, cupulæ e basi attenuatâ turbinate-campanulatâ 5 lin. altâ levî 6-dentatâ, dentibus 1-1 $\frac{1}{2}$  lin. longis latisque subrecurvis, alternis parum brevioribus, baccâ (immaturâ) semixertâ ovali mucronulatâ rugulosâ flavidâ. — Fortasse sp. distincta, ad P. Lingue accedens, sed specim. nostra insufficientia. (v. s. in hb. Boiss.)

P. 50, n. 26, lin. 6, *lege* (collectore ignoto).

P. 50, n. 27. *Persea scrobiculata* rectius in Sect. II, post n. 41 collocanda est.

P. 50, n. 28. Huc revocanda est P. *splendens* β *lanceolata* (supra p. 45, n. 2) quæ cum plantâ Lundii identica. Ejusdem var. videtur :

β? *Matthewsii*, foliis modice coriaceis concoloribus plus minus obtusis utrinque densissime subprominulo-reticulatis, costis tenellis adscendentibus supra subimmersis subtus cum venis intercostalibus crebris subtilibus prominulis. — In Peruvîâ circa Cachapoyas (Matthews!). Folia 2-3 $\frac{1}{2}$ -poll., 12-14 lin. lata, petiolo 3 lin. puberulo. Flores ignoti. Paniculæ fructiferæ axillares, 4-6-poll., laxæ, glabræ, ramis patulis 4-2-poll. Cupulæ sessiles, campanulatæ, 3-4 lin. altæ, diam. 2 $\frac{1}{2}$ -3 lin., dentibus 6 æqualibus erectis acutis 4 lin. longis latisque fuscis. Bacca (submatura) exserta, oblongo-ovalis, mutica, 5 lin. longa. Forsan sp. distincta, sed non satis nota. (v. s. in hb. Boiss.)

P. 51, lin. 6, *pro ramosis et cymosis lege ramosæ et cymosæ.*

P. 51, n. 31, lin. 6, *adde* : Arbor 60-ped., ex de Vriese mss.

- P. 52, lin. 3, *pro* cornatis *lege* coronatis.
- P. 53, lin. 3, ante *synon. adde*: Bot. Reg. t. 1258. Tuss. Fl. Antill. 3, t. 3. *Persea Americana* Mill.
- P. 59, n. 5, lin. 4, *pro* Palembang *lege* Palembang.
- P. 60, n. 1. HAASIA ELONGATA Bl. *adde*:  $\beta$  *angustifolia* (Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 360), foliis obovato-lanceolatis acutis, raro subobtusis. — In Sumatræ occid. prov. Priaman.
- P. 62, n. 13. HAASIA? CÆSIA Miq. Hujus? v. forsân potius *Cyanodaphnes?* formam foliis minus cæsiis et costis magis patentibus, in Sumatræ austr. prov. Lampong a Teysmanno lectam (steril.) indicat cl. Miquel Fl. Ind. Bat. suppl. p. 360.
- P. 62, post n. 13 inseratur:
- n. 13\*. HAASIA? SUBCÆSIA (Miq. l. c. suppl. p. 364), foliis subpergamaceis e basi acutâ v. subeuneatâ elliptico-oblongis v. sæpius sublanceolatis plerumque obtuse attenuato-acuminatis supra lucidis subtus cæsiis glabris utrinque tenerime reticulatis. — In Sumatræ austr. prov. Lampong (Teysmann.). Ramuli graciles, albicantes, gemmis parce pilosulis. Folia sparsa v. summa confertiora, modice petiolata,  $6\frac{1}{2}$ -3 poll. longa, in sicco subtus rubello-fuscescentia, costis utrinsecus 8-10 erecto-patulis teneris fusco-rubellis. Flor. ign. A H. cæsiâ differre dicitur foliis angustioribus, minus obversis cæsiisque, in sicco supra olivaceo-fuscis nec nigricantibus.
- P. 62, inter citata Beilschmiedie, *pro* Messn. *lege* Meissn.
- P. 63, lin. 11, *pro* e quibus *lege* a quibus
- P. 63, n. 2, lin. 2, *pro* uquali *lege* æquali
- P. 64, n. 1. APOLLONIAS CANARIENSIS Nees, *adde* *synon.*: *Laurus Barbusana* Lowe prim. fl. Mader. p. 16. L. nitida Masson, ex not. DC.
- P. 67, lin. 6, *pro* hist. med. *lege* hist. nat.
- P. 67, ante Trib. II, inseratur:
2. BOLDU NITIDUM, glaberrimum, foliis oppositis coriaceis oblongo-ellipticis supra luteo-viridibus subtus glaucis, reticulo laxiusculo parum prominente, calyce extus glaberrimo, lobis oblongis.  $\frac{5}{2}$  In Andium Chilens. distr. Linares (Germain). Bellota nitida Philippi in Linnæa 29, p. 39. Pedicelli  $2\frac{1}{2}$  lin. longi. Fructus ovati, abrupte acuti, 9 lin. longi, 6-7 lin. crassi, loculamento globoso. Secundum auctorem a *B. Chilano* foliorum formâ et colore, reticulo laxiore minusque prominulo, pedicellis longioribus et calyce extus puberulo distincta (si specim. a Germain lecta a nobis visa ad speciem Philippianam spectant) ex nostro arbitrio potius meram illius formam sistit.
- P. 67, ante Trib. II, inseratur novum genus:
- XII\*. ICOSANDRA Philippi in Linnæa 29, p. 39.
- Flores hermaphrodit. 5-meri, paniculati. Calyx 10-fidus, subæqualis, lobis biseriatis ovatis acutis. Stamina 20, quadriseriata, eglandulosa, exteriora 15 fertilia, interioribus 5 extrorsis, intima 5 sterilia (staminodia) filamentis brevissimis, antheris ovatis dorso pilosis 2-ocularibus, valvulis ab apice deliscentibus. Staminodia oblongo-fliformia, extus pilosa, intus glabra. Ovarium calycis tubo immersum, 1-loc., 1-ovulatum. Stigma capitatum. — Genus secundum auctorem *Boldu* proximum, partium numero quinario ab omnibus Lauraceis veris distinctissimum.
- I. RUFESCENS (Philippi l. c. p. 40\*).  $\frac{5}{2}$  In Chile austr. prov. Concepcion prope Tomé (Germain). Arbor elegans, ramulis foliisque novellis puberulis, adultis glaberrimis. Folia subopposita vel per paria approximata, valde coriacea, penninervia, ovata, obtusa, margine crasso subrevoluta, in sicco rufa, 18 lin. longa, 11 lin. lata, petiolo  $2\frac{1}{2}$  lin. longo, venis dense reticulatis. Paniculæ folio duplo vel triplo longiores, foliosæ, ramis sub anthesi 4 lin., pedicellis vix 1 lin. longis bractea parvâ ovatâ fultis, calycis lobis vix 1 lin. longis. Fruct. ignot.
- P. 67. BOLDU, *adde*: Secundum cl. Philippi (in litt. ad A. DC. d. 31. Jul. 1863 cum delin. fruct.) verisimiliter duæ species distinguendæ sunt, quarum altera fructu gaudet pruniformi (fere 2 poll. longo, 13 lin. crasso) rubro, paullulum ruguloso; altera fructu luteo lævissimo basi magis attenuato (cæterum quoad magnit. simili).

De reliquis differentiis nil traditur. Pedicellus fructifer ex delin. non incrassatus. Pericarpium (ex descr.) tenue, carnosum, ad maturitatem circ. consistentiæ pericarpium *Æsculi*. Semen magnum, testâ tenui pericarpio adhærente. Cotyledones magne, carnosæ, gustu castanearum et vix aliquid aromaticæ; radícula supera; plumula minuta, foliis 2 distincte conspicuis. Glandulæ 6 staminales secundum el. Philippi inter stamina fertilia exteriora et interiora, nec (ut in ic. apud cl. Gay exhibentur) inter hæc et ovarium positæ sunt.

- P. 67. *ADENOSTEMUM*, *addè*: Hujus generis, hucusque non satis noti, fructus a cl. Philippi (l. c. cum delin.) sequenti modo describitur: Drupa regulariter ovalis, 15 lin. longa, 1 poll. crassa, colore citrino, carne duriusculâ pallide luteâ eduli. Pyrena durissima, fusca, punctis lineolisque impressis sulcisque tribus longitudinalibus ab apice acuto ad basin rotundatam decurrentibus notata, intus dissepimentâ tria, sed loculum unicum tantum ovulo fœtum, reliquos vero constanter vacuos exhibens. Semen fere  $\frac{1}{2}$  pyrenâ brevius, obovatum, compressum, basi (?) acutum, testâ tenuissimâ fuscâ, endospermio albo. Embryo « in basi albuminis magni situs, radiculâ inferâ. » Quam embryonis descriptionem, a Lauracis omnino abhorrentem, erroneam esse suspicamur. Embryonis extremitas radicularis est verisimiliter superior et sic dictum « albumen » procul dubio e cotyledonibus 2 arcte sibi invicem adplicitis constat.
- P. 69, n. 2. *addè*: in Sumatræ orient. prov. Palembang (Teysm.). Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 360.
- P. 69, n. 2\*. *CRYPTOCARYA TEYSMANNIANA* (Miq. l. c. suppl. p. 360), foliis subcoriaceis e basi acutâ vel subcuneatâ raro rotundatâ elliptico-oblongis vel subcuneiformibus acuminatis acutis vel apice rotundatis, supra lucidulis impresso-costatis demum glabris, subtus cæsioglaucis, prominulo-reticulatis paniculisque tomentellis demum glabrescentibus. 5? In Sumatræ orient. prov. Palembang (Teysm.). Ramuli, petioli, foliorum nervi subtus cum inflor. rufo-tomentelli. Folia 5-3 poll. longa, nervo supra sulciformi, costis utrinsecus 9-10 erecto-patulis arcuatis in siccis fusciscentibus. Paniculæ terminales, 4-5-ramosæ, demum subglabratae. Baccæ globoso-ellipsoideæ, magnit. cerasi minoris, glabræ. — Affinis *C. cuneatâ*  $\gamma$  opacæ, ex Miq.
- P. 69, n. 4, lin. 1, *lege* foliis e basi, etc.
- P. 69, post n. 4, inseratur: 4\*. *C. PALEMBICA* (Miq. l. c. suppl. p. 360), foliis chartaceis e basi acutâ elliptico-vel obovato-oblongis breve acuminatis acutisve subtus glaucis tenerrimè denseque reticulatis pube brevi simplici et stellatâ ochraceo-vel griseo-tomentellis, paniculis laxifloris pubescentibus, floribus extus albedo-velutinis. 5? In Sumatræ orient. prov. Palembang (Teysm.). Ramuli septioli que puberuli. Folia majora semipedalia, sicca utrinque fusciscentia, supra excepto nervo fere glabra, costis erecto-patulis arcuatis. Paniculæ axillares, pedunculatæ. Calycis lobi elliptici, subæquales. Antheræ piliferæ. Affinis *C. reticulatæ* et diversifoliæ, ex Miq.
- P. 70, n. 7. *C. acutiflora* Bl. *addè* synonym.: ? *Laurus flava* Reinw., fide Hassk. cat. H. Bogor. 1844, p. 89.
- P. 70, n. 9,  $\beta$ , *addè*: Baccæ demum fere globosæ, lævis, nigra, nitida, diam. 4-5 lin. ex specim. Thwait. n. 414!
- P. 71, n. 14, lin. 4, *pro* dense *lege* denso
- P. 72, n. 17. *CRYPTOCARYA AMYGDALINA* Nees! *addè*: In Nepaliâ (fide sp. autograph. Nees in hb. Mart.). Folia penninervia, costis semierectis tenuibus supra vix prominulis, infimis oppositis magisque erectis, reti densissimo tenui leviter prominulo. Paniculæ 4-poll., corymbiformes, pedunculo tenui glabriusculo a medio ramoso, ramis alternis, ultimis dichotomis floribusque (vix  $\frac{1}{2}$  lin. longis) cano-tomentellis. Calycis limbus tubo longior, lobis acutis.
- P. 73, n. 20, *addè*: Formam foliis ovali- et lanceolato-oblongis concoloribus in Novâ Holland. austro-orientali circa Illawara lectam misit Ferd. Müller! Baccæ siccæ, nigrae, nitidæ, subrugulosæ, subglobosæ vel transversæ ovales (diam. longit. 4-5 lin., transversali 6-8 lin.), calycis limbo deciduo orificium minutum relinquente. (v. s. in hb. DG.)
- P. 73, n. 21. *C. OBOVATA* R. Br. Ferd. Müller! in Bot. Mus. of Melbourne. In Nov.

Holl. orient. extratrop. ad Clarence river. Folia rigida, e basi attenuatâ obovata et oblonga, rotundato-obtusissima vel obtuse subapiculata, concolora vel juniora subtus glaucescentia, supra nitida, 2-4-poll., 10-16 lin. lata, petiolo 4-6 lin. semitereti valido sulcato cum nervo costisque subtus subimpressis subevanescentibus, subtus prominulis fuscis, venis venulisque supra nullis subtus obsolete raris vel passim crebrioribus subreticulatis. Paniculæ terminales et in summis axillis nascentes, 1-2-poll., laxæ, ramis bifido-cymosis, pedicellis  $\frac{1}{2}$  lin., floribus  $1\frac{1}{2}$  lin. longis cano-tomentellis, lobis oblongis acutis tubo obovato subbrevioribus. Fruct. non vidimus. — Huc certe spectat planta Mulleriana (Cryptoc. glaucescens F. Müll. in hb. Hook.) quam supra p. 78 sub *Endiandrâ glaucâ* descripsimus. (v. s. in h. DC.)

- P. 73., *adde* : n. 22\*. *CRYPTOCARYA OBTUSIFOLIA* (Ferd. Müller! mss.), foliis rigidis e basi attenuatâ obovatis oblongisque obtusis concoloribus utrinque laxiuscule prominulo-reticulatis ramulisque glaberrimis supra nitidis, paniculis junioribus cano-tomentellis. 5 In Novâ Holl. orient. extratrop. ad Clarence river (Ferd. Müll.). Folia 2-3-poll., 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, petiolo 3-4 lin. semitereti, costis patulis arcuatim connexis tenuibus nervoque utrinque æqualiter semiprominulis, venis venulisque tenellis acute expressis, reticuli areolis diam. circ. 1 lin. Paniculæ in summis axillis nascentes, solitariae, circ. 1 $\frac{1}{2}$ -poll. longæ (flor. nondum expansis). Proxima *C. Mülleri*, quæ præsertim foliorum panicularumque pubescentiâ statim dignoscenda. (v. s. in h. DC.)
- P. 73., *adde* : n. 22\*\*. *C. RIGIDA*, foliis rigidis ellipticis oblongisque basi subito apices sensim attenuatis acutis utrinque dense prominulo-reticulatis, supra glabris nitidis subtus albedo-vel subfulvo-glaucis minute puberulis, pedunculis cano-tomentellis. 5? In Nov. Holl. ad Clarence river (Ferd. Müll.). *C. patentinervis* Ferd. Müll. mss. in Bot. Mus. of Melbourne. Rami fusci, apice angulati, juniores fulvo-vel cano-tomentelli. Folia 1 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, petiolo semipollicari semitereti tomentello costis semierectis (nec patentibus) tenuibus prope marginem arcuatim junctis subtus modice supra vix prominulis, reticulo tenero utrinque æquali, paulo densiore quam *C. obtusifoliæ*. Racemi folio breviores, flor. . . . . Bacca oblonga, utrinque attenuato-acutiuscula, nigra, opaca, calycis limbo persistente erecto fere 1 lin. longo apiculata, 8 lin. longa, diam. 4-5 lin. — Affinis *C. Mülleri* et *obtusifoliæ*, ab utraque pubescentiæ indole et foliis acutis densius reticulatis distincta. Nomen ab inventore datum haud idoneum mutandum erat, nam costæ potius minus quam magis patentes ac in sp. affiniibus. (v. s. in h. DC.)
- P. 73, n. 24, *adde* :  $\beta$  *attenuata*, foliis e basi plus minus attenuatâ acutâ oblongis obtuse subacuminatis utrinque obsolete minuteque immerso-reticulatis, supra læte viridibus subnitidis subtus albedo-glaucis. 5? In Nov. Holl. orient. extratrop. ad Hastings river (Ferd. Müll.). Folia 2-4-poll., 10-18 lin. lata, petiolo 3 lin., juniora subtus in nervo sub lente puberula. Paniculæ circ. 4-poll., juniores fulvo-tomentellæ. Bacca jun. globosa, lævis, nigra, diam. vix 5/4 lin., calycis limbo angusto truncato brevissime apiculata. (v. s. in h. DC.)
- P. 73, n. 25, *adde* : ad Archer's Creek legit Leichardt, fide specim. fructif. in h. DC. cum Cunninghamianis bene congruo.
- P. 73, n. 28, lin. 5, *pro* albide *lege* albido
- P. 74, n. 27. *C. BIDWILLII*. Ad Hastings river, Port Macquarie, Nov. Holl. orient. extratrop. (Ferd. Müll. in h. DC.)
- P. 75. *CRYPTOCARYA PEUMUS*, *adde* : Sub hoc nomine formæ (vel forsân species) tres distinguendæ sunt, quarum fragmenta a cl. Philippi in litt. supra citatis missa ante oculos habemus, scil. :
- 1<sup>o</sup> *C. PEUMUS* Nees, Phil.! foliis opacis subtus vel utrinque punctatis vel minute reticulatis, costis immersis vel supra leviter impressis parum conspicuis, calycis lobis tubo circ. dimidio longioribus. Hujus loci sunt specim. a nob. l.c. citata Ruiz., Domb., Berter., Poepp., Germain, etc.
- 2<sup>o</sup> *C. STENANTHA* Phil. mss.! (circa Valparaiso lecta), foliis supra subnitidis leviter impresso-costatis subtus punctulatis, calycis (2 lin. longi) lobis tubo angusto circ. dimidio brevioribus. — Hanc calycis formam tamen passim etiam sub præcedente (v. g. specim. Ruiz) observamus.

- 3° *C. NITIDA* Phil. msc. ! (in valle de S. Ramon prope Santiago lecta), foliis supra nitidis utrinque leviter prominulo-venosis haud punctatis, costis paulo minus patentibus laxè anastomosantibus, calyce (juniore) ut in *C. Pæumo*.
- P. 76, n. 36, lin. 3, *pro* densiusque *lege* densiuscule
- P. 77, *adde* : n. 1\*. *CYANODAPHNE GLABRA* (Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 360), foliis anguste cuneato-vel subobovato-oblongis breve acuminatis subtus glaucis glabris (8-4-poll.), corymbis axillaribus longe pedunculatis paucifloris. 5? In Angkola, Sumatra boreali. (Jungh.)
- P. 77, n. 2. *C. TOMENTOSA* Bl. Folia subtus demum fere glabrata, non nisi compage crassiore firmiore a *C. cuneatâ* diversa, cui igitur species potius conjungenda videtur, momente cl. Miquel l. c., suppl. p. 360. In Sumatræ austr. prov. Lampong (Teysm.)
- P. 77, n. 2. *CARYODAPHNE AUSTRALIS* A. Br., *adde* synon. : *Cryptocarya triplinervia* Ferd. Müller! Moreton-Bay. (h. DC.)
- P. 78, n. 3, β. Ad fl. Clarence, oræ orient. extratrop. (F. Müll.!). Drupa infera, ovata, rugulosa, utrinque acutiuscula, 4 lin. longa, 3 lin. crassa, calycis limbo brevissimo truncato. Ramuli dense ferrugineo-tomentosi, folia subtus demum glabrescentia glaucescenti-pallida.
- P. 78, n. 1. *ENDIANDRA GLAUCA* R. Br. Synon. Müll. et descr. nostra (ad plantam Mullerianam facta, quam nunc florum perfectiorum examine omnino *Cryptocaryæ*, nec *Endiandræ* generis esse comperimus) excludantur et ad *Cryptocaryam* obovatam R. Br. (supra p. 73, n. 21) transferantur.
- P. 79, n. *adde* : 2\*. *ENDIANDRA PUBENS*, foliis sparsis modice coriaceis elliptico-et lanceolato-oblongis utrinque attenuatis apice obtusis dense prominulo-reticulatis subconcoloribus supra glabris subtus cum ramulis pedunculisque dense fulvo-tomentosis demum parcius puberulis, paniculis laxè multifloris. 5 In Nov. Holl. orient. extratrop., ad fl. Clarence (F. Müll.!). *Endiandra* sp. F. Müll. ! — Folia subchartacea, 2-5-poll., 9-22 lin. lata, pet. 3-4 lin. gracili tereti, costis ascendentibus arcuatim coeuntibus, supra cum nervo venisque tenuibus leviter prominulis, subtus fortiter expressis densius fulvo-villosulis, reti tenero subtus densiore plus minus prominulo. Paniculæ axillares et terminales, 1-2-poll., ramis tenuibus 1- $\frac{1}{2}$  poll. longis subdichotomis, pedicellis vix 1 lin. longis basi bracteâ exiguâ lineari fugaci fultis. Calyx subcampanulatus, 1 lin. longus, minute puberulus, lobis brevibus conniventibus. Antheræ 3 exsertæ. (v. s. sine fr. in h. DC.)
- 2\*\*. *E. VIRENS* (Ferd. Müller! mss. in h.), foliis chartaceis e basi attenuatâ acutâ lanceolatis obtusiusculis utrinque læte viridibus glabris tenere denseque subprominulo-reticulatis, paniculis laxis glaberrimis. 5? Ad flum. Clarence (F. Müll.!). Folia 2-3-poll., 6-9 lin. lata, petiolo 1-2 lin. tereti tenui, nervo supra tenui immerso subtus fortiore prominente cum venis pallido, costis semierectis tenellis obsolete arcuato-connexis venisque utrinque levissime prominulis. Paniculæ axillares et terminales, 1-1 $\frac{1}{2}$ -poll., pedicellis 1- $\frac{1}{2}$  lin. longis bracteâ parvulâ fugaci fultis. Calyx 1 lin. longus, ovatus, basi rotundatus, lobis brevissimis. Antheræ 3 exsertæ. (v. s. sine fr. in h. DC.)
- 2\*\*\*. *E. MULLERI*, foliis coriaceis e basi vix attenuatâ acutâ ellipticis vel oblongo-ellipticis obtuse acuminulatis concoloribus glabris supra v. utrinque minute serobiculato-reticulatis, corymbis brevissimis paucifloris fulvo-tomentellis. 5? Ad fl. Clarence (F. Müll.!). Folia 1 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, petiolo 3 lin., reticulo subtus interdum oblitterato. Corymbi semipollicares. Calyx 1 lin. longus, lobis æqualibus tubo brevioribus. Stamina 3 intima fertilia, extrorsa, pistillum æquantia, antheræ 6 exteriores steriles breve stipitatæ. Bacca ovalis, utrinque attenuata, 6 lin. longa, 4 lin. crassa, rugosa, viridi-flava, calycis limbo breviter apiculata. Valde similis *Cryptocaryæ* microneuræ (supra p. 73, n. 25) sed præter char. generic. distincta foliis minoribus, reticulo teneriore subtus minus conspicuo vel immerso, costis supra in depressione levi vix prominulis subtus vero acutius expressis. (v. s. in h. DC.)
- P. 80, n. 7, *adde* : In Sumatrâ australi (Teysm.) Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 359.
- P. 82, n. 1. Synon. *adde* : *Douglassia laurina* Sm. in Rees Cyclop. vol. 12? (ex cit. Aubl.)
- P. 82, n. 1, lin. 12, *pro* inde pressione *lege* in depressione.

- P. 83, n. 4, lin. 3, *pro minute lege minuto.*
- P. 83, n. 4. Speciebus excludendis adde : A.? *TENUIFLORA* Nees! mss. in hb. Monac.  
Ex specim. imperfecto videtur *MESPILODAPHNE INDECORA* α Nob.
- P. 84. *SILVÆA*. Adde : Deser. vide in Mohl et Schl. Bot. Zeit. 1854, p. 454.
- P. 84. in char. gener. *Acrodielidii*, lin. 4, *lege tria intima extrorsa*, etc.
- P. 86, n. 8, lin. 5, adde : Spruce in Hook. Journ. 1851, p. 145.
- P. 86, n. 8, β, lin. 1, *deleatur apice*
- P. 87, lin. 5, *lege* Folia sparsa, raro opposita
- P. 87, n. 12, lin. 4, adde : Arbor 35-40-ped. R. Schomb. in Hook. Lond. Journ. 3, p. 630.
- P. 87, n. 13, adde : in prov. Minas Geraës.
- P. 88, lin. 2, *lege* Bacca ovalis, semiinserta
- P. 88, n. 2, adde : Bacca sicca, dura, ovoidea, 3½ poll. longa, 2 poll. crassa (Peckolt in hb. Mart.).
- P. 88, n. 9, ad calcem, adde : (v. s. in h. petrop.)
- P. 91, n. 16, β, *lege* attenuatum.
- P. 91, n. 18, lin. 1, *lege* ramulis tomentosis
- P. 91, n. 20, lin. 6, *lege* subopaca, concolora
- P. 93, n. 28, lin. 6, *pro connexo lege* convexo
- P. 94, n. 30, lin. 2, *lege* breviter acutatis
- P. 94, n. 33, lin. 6, *pro subconcoloraria lege* subconcolora
- P. 94, n. 34, lin. 6, adde : Mart. Arzneipl. p. 10.
- P. 95, n. 37, lin. 5, *lege* Poiteau n. 60! Perrott. n. 76!
- P. 95. *MISANTECA*. Char. gen. adde : Cupula e basi rotundatâ 5 lin. alta, secus longitudinem irregulariter vel obsolete 6-rugosa, papilloso-punctata, margine dupliæ, interiore erecto integerrimo vix  $\frac{1}{3}$  lin. alto, exteriori patente irregulariter repando-lobato hinc 1-2 lin. inde vix  $\frac{1}{4}$  lin. lato, lobis obtusis.
- P. 98, n. 6, lin. 9, *pro congestis lege* congesta
- P. 99, n. 41, lin. 6, *lege* fide Riedelii
- P. 99, n. 13, lin. 12, *pro minutæ lege* minute
- P. 99, n. 13, lin. 16, *pro forma lege* formæ
- P. 99, n. 13, α, lin. 4, *pro sericicola lege* sericeola
- P. 100, ε, lin. 5, *pro* Helmrinhen *lege* Helmreichen
- P. 100, n. 15, α, lin. 2, *pro* Max. *lege* Mart.!
- P. 101, n. adde : 19\*. *MESPILODAPHNE OPIFERA* Nob. Synon. : *Oreodaphne opifera* Nees, supra p. 112, n. 4, cum descr. et cit. omnibus, quæ propter fructum huc transferenda.
- P. 103, n. 23, lin. 4, adde : Leprieur n. 223. Weddell n. 230!
- P. 103, adde : n. 23\*. Huc transferatur *M. fasciculata* (supra p. 108, n. 47).
- P. 103, n. 23\*. *MESPILODAPHNE NITIDULA* Nob. Syn. : *Oreodaphne nitidula* Nees, nob. supra p. 136, n. 117, cum descr. et var. Fructum maturum quidem non vidimus, sed flores omnino *Mespidodaphnes*, et habitus (foliis ramulisque per intervalla verticillato-congestis) simillimus *M. proliferae* et *fasciculatae*, ita ut illam cum hisce speciebus potius in unam conjungendam esse facile opinari possit; attamen a priore recedit foliorum nervo supra prominulo (nec impresso) a posteriore racemis longioribus glabris, ab utraq. foliorum costis reticuloque plus minus conspiciis nec omnino obliteratis.
- P. 103, n. 24, γ, lin. 4, *pro* Canclilla *lege* Canelilla
- P. 105, ante n. 29, inseratur :

- 28\*. *MESPILODAPHNE FÆTENS*. Synon. : *Oreodaphne fetens* Nees, nob. supra p. 118, n. 32, cum descr. et citat. omnibus. Stirps inter *Oreodaphnes* species nulli vere affinis, flore fructuque vero (quod prius nos fugisse dolemus) cum *Mespidodaphne* conveniens et quidem cum sequente speciebus Mascarenensibus arcte cognata.
- 28\*\**. M. BULLATA*. Synon. : *Oreodaphne bullata* Nees, nob. supra p. 118, n. 31, cum cit. et descr. Fructus quidem ignotus, sed species evidenter præcedenti et *M. capulari*, heteromorphæ et Persoonianæ proxime affinis igiturque huc transferenda.
- P. 105, n. 32, *adde* synon. : *Laurus coccineus* Bojer in hb. Monac.! Madagascar. (Synon. nec apud Nees, nec apud Steudel. ed. 2 citatum.)
- P. 107, n. 40, *adde* : Fendler n. 1807! in coloniâ Tovar, Venezuela, alt. 5000 ped.
- P. 108, n. 47. *M. FASCICULATA*! Excl. Leprieur n. 223 (quæ ad *M. proliferam*, supra p. 103, n. 23 spectat) et add. Schomburgk n. 925! Ramuli verticillato-congesti, unde species in § 2 prope *M. proliferam*, cui valde similis, collocanda.
- P. 108, *adde* : n. 47\*. *M. RIEDELI*, foliis coriaceo-chartaceis e basi attenuatâ elliptico- vel lanceolato-oblongis acuminatis ramulisque sparsis glabris, costis adscendentibus nervoque supra impressis subtus prominulis, venis supra nullis subtus tenerimis laxiuscule subimmerso-reticulatis vel obsolete, paniculis sessilibus minute parceque puberulis. ♂ In Brasiliâ (Riedel n. 484!). Arbor 15-25-ped. Folia concolora, demum rigidula, supra nitida vel opaca, 2½-4-poll., 9-16 lin. lata, petiolo tenui 3 lin. longo canaliculato. Paniculæ axillares solitariae, in corymbum terminalem approximatae, 1½-2½ poll. longæ, pedunculo a basi ramoso ebracteato, jun. sordide fulvo-tomentoso, ramis 1-½ poll. longis patulis strictis racemoso-5-plurifloris. Calyx pedicello paullo longior, patulus, diam. 2 lin., lobis tubo longioribus ovatis obtusiusculis demum glabris. — Accedit ad *M. fasciculatam*, sed distincta ramulis sparsis (nec subverticillatis) foliorum costis minus divergentibus (haud patulis) utrinque conspicuis supra læviter impressis subtus satis argute prominulis, reticulo subtus visibili subtili. (v. s. sine fr. in h. petrop.)
- P. 110. Ad calcem char. gen. *Agathophylli adde* : De cotyled. cfr. Duch. in Ann. sc. nat. 3<sup>e</sup> sér. 10, p. 222.
- P. 110, n. 2, lin. 6, *pro* pedunculi *lege* pedunculus
- P. 112, n. 1, lin. 14, *pro* brevissime *lege* brevissimo, et *adde* synon. : *Laurus Ocotea* Rich., ex Steud.
- P. 112, n. 4, lin. 3, *pro* minute *lege* minuto, et *adde* : Species propter fruct. jun. cupulâ inclusum ad *Mespidodaphnen* (supra addit. ad p. 101, n. 19') referenda, fide specim. Riedel. in hb. petrop. Mart. Arzn. Pl. p. 11.
- P. 114, n. 14. O. Jacquini, *adde* : Aquart in hb. Jacq.! Isert in hb. Schumach.! (Petrop.)
- P. 114, n. 15, lin. 5, *lege* n. 987 ex parte.
- P. 115, n. 19, lin. 9, *pro* tenere *lege* tenero.
- P. 118, n. 31 et 32, sunt species ad *Mespidodaphnen* repellendæ, cfr. supra *M. fetens* et *bullata* Nob.
- P. 119, n. 19, lin. 3, *lege* paniculis infra-terminalibus
- P. 119, n. 19, lin. 6, *pro* quod tamen *lege* quod nomen tamen
- P. 121, n. 42, lin. 2, *adde* : *Aniba Guianensis* hb. DC.! (an Aubl.?)
- P. 121, n. 44, β, *adde* : in Brasiliæ prov. Goyaz specim. fruct. sine fl. (ideoque dubia) legit Schott n. 5598. (hb. vindob.)
- P. 121, n. 45, lin. 1, *pro* subulato, *lege* subalato-5-gonis
- P. 121, n. 45, lin. 6, *adde* Blanch. n. 605!
- P. 122, n. 48, lin. 5, *pro* dense *lege* densâ
- P. 124, n. 55. Species ob calycis fructiferi lobos diu persistentes (an unquam deciduos?) forsan ad *Strychnodaphnen* removenda.
- P. 125, n. 60, lin. 6, *pro* floriferis *lege* floriferi, et *adde* : Spruce n. 642! et? 647. (hb. monac.)

- P. 126, n. 64, lin. 5, *pro Japonensis lege Japurensis*
- P. 128, n. 77, lin. 9, *pro O. tristam lege Mespilodaphnen tristem*
- P. 129, n. 81. O. TARAPOTANA, *adde* : Floribus præsertim O. gracili proxime accedens, sed costis adscendentibus, nec patulis, constanter diversa.
- P. 132, n. 99, lin. 11, *pro scrobuliformibus lege scrobiculiformibus*, et *adde* : Paniculæ (ex sp. Pohl.) interdum 4-6-pollicares, unde species potius ad § 1 prope O. declinatam (supra p. 114, n. 13) transferenda, cui (præcipue sp. Vauthier n. 545) valde similis.
- P. 134, n. 108, lin. 3 et 4, *lege Tomependa*, et Bofo.
- P. 134, n. 109, lin. 2, *pro acute lege acutâ*
- P. 136, n. 117. O. NITIDULA, nunc est Mespilodaphne nitidula Nob. Cfr. adnot supra.
- P. 137 n. 120, lin. 2, *pro breviter lege leviter*
- P. 140, n. 2, lin. 3, *pro minutos ubimmerso lege minuto subimmerso*
- P. 141, lin. 3, excludatur planta Guianensis Sagot. n. 810, quæ est Oreodaphne fallax, supra p. 125, n. 61.
- P. 143, n. 2, lin. 2, *lege cupulæ lobis reflexis.*
- P. 144, n. 2, lin. 8, *pro tenellsi lege tenellis*
- P. 146, n. 1,  $\alpha$ , lin. 2, *pro Martens lege Mertens*
- P. 149, n. 9, lin. 9, *pro tomenso lege tomento*
- P. 150, n. 12, lin. 6, *adde* : in prov. Goyaz, Pohl n. 1825! (h. vind.) Pedicelli demum 3 lin. longi.
- P. 151, n. 13,  $\beta$ , lin. 1, *lege subacuminatis e basi*, etc.
- P. 151, n. 15, lin. 5, *adde* : ad Cantagallo, Luschn. in hb. Mart.!
- P. 152, n. 17. Nect. grandiflora, *adde* :  $\alpha$ ? *barbellata*, foliis coriaceis lanceolato-oblongis (circ. 3-poll., 1 poll. lat., petiolo valido 3 lin. longo atro) supra minute impresso-areolatis, costarum axillis supra interdum paullo tumidulis, subtus barbellatis, pedicellis fructiferis 4-5 lin. longis sursum incrassatis, cupulâ patellari 1-1½ lin. altâ, diam. 3 lin., baccâ ovali demum subglobosâ 6 lin. longâ. Cæc. ut in  $\alpha$ . — Circa Villarica legit Pohl n. 3718! (h. vind.)
- P. 154, n. 24, lin. 1, *pro et basi lege e basi*
- P. 156, n. 28, lin. 3, *adde* : Rob. Schomburgk in Hook. Lond. Journ. 3, p. 626. Arbor 60-ped.
- P. 156, n. 30, *adde* : Mart. Arzn. Pfl. p. 3. Species cum N. limbata (n. 31) ad § 1, Reticulatas, referenda.
- P. 159, lin. 14, *pro cupuliformes lege capituliformes*
- P. 159, n. 41, lin. 8, *adde* Schomb. n. 69!
- P. 160, lin. 2, *lege Moyobamba.*
- P. 160, § 2, *lege venæ nullæ.*
- P. 161, n. 47,  $\beta$ , *adde* : Canella amarella incolarum, circa Congonhas do Campo Dr Stephan in hb. Mart.!
- P. 163, n. 58, *adde* : in prov. S. Paul. Arbor præalta, teste Lund in h. DC.
- P. 163, n. 59, *lege* N. coriacea Meissn. (nec! Griseb.) excl. syn. Swartz et Griseb., quæ, comparato specim. autograph. Lauri coriaceæ Swartz! nuper in hb. DC. invento, a plantâ Neesii longe diversa et procul dubio ad N. Willdenowianam Nees referenda, paullo tantum a stirpe vulgari recedens foliis magis nitidis et reticulo densiore magisque prominulo. Synon. Oreodaphne coriacea Nees (excl. cit. Sw.) et Griseb. certe! ad Nect. coriaceam nostram (nec Griseb.) pertinet.
- P. 164, n. 60, lin. 12, *lege* utrinque conspicuis, et *adde* : Ad fl. Amazon., Pæppig n. 2364!
- P. 165, n. 63, lin. 3, *pro rete lege reti.*

- P. 165, n. 64. NECT. WILLDENOWIANA Nees; hujus variatio foliis dense reticulatis magisque nitidis est *Laurus coriacea* Swartz! (fide specim. autogr. in h. DC.) quæ *Nect. coriacea*. Griseb (nec nob. supra n. 59.) *N. anonyma* Steudel nom. ed. 2. Sub var.  $\beta$  *adde* synon.: *Laurus exaltata* hb. Schott., fide Nees l. c.
- P. 166, n. 69, *adde*: Mart. Arzn. Pl. p. 3.
- P. 167, n. 72, lin. 12, *pro* Ryalianam *lege* Regelianam
- P. 167, n. 74, lin. 4, *pro* Schoff *lege* Schott
- P. 168, n. 1, lin. 7, *pro* addendo *lege* addenda
- P. 168. Speciebus exclusis *adde* :
- NECTANDRA DECANDRA Roxb. (ex Steudel). = *Linostoma decandrum* Wall.
- NECTANDRA LÆVIGATA Berg. = *Gnidia oppositifolia* L.
- NECTANDRA SERICEA Berg. = *Gnidia sericea* L.
- NECTANDRA TETRANDRA Berg. = *Struthiola erecta* L.
- } Thymeleaceæ.
- P. 171, n. 1, S. officinalis, *adde*: Bigelow Med. Bot. t. 35.
- P. 171, n. 2, *adde* synon.: *Laurus albida* Loudon, ex Steud.
- P. 172, lin. 12, *pro* lobata *lege* lobatæ
- P. 172, n. 1,  $\gamma$ . Huc verisimiliter referenda est *Gœppertia panicularis* Nees Syst. p. 368.
- P. 174, n. 8, *adde*: Paniculæ 2-4-poll., pedunculo gracili supra medium ramoso, ramis circ. semipollicaribus densifloris. (v. s. in h. Hook. et Monac.)
- $\beta$ , *Lherminieri*, petiolo brevissimo crasso (2 lin. longo) venis intercostalibus subtus minus conspicuis subtilibus vix prominulis, interstitiis obsolete vel plerumque haud reticulatis. Cæt. ut in typo. — In Guadeloupe, *Lherminier*! (v. s. fruct. sine fl. in h. DC.)
- P. 176, n. 1, lin. 4, *pro* v. foliorum *lege* foliorum
- P. 176, n. 2, lin. 10, *pro* ramosæ *lege* ramoso
- P. 177, lin. 1, *lege* excl. *Polyadeniæ* et *Lauro*.
- P. 179.  $\epsilon$ , *platyphylla*. *Adde* synon.: *Laurus crucifolia* Noronha in Verhand. Batav. Genootsch. 5, p. 64? fide Hassk. — In Whitsunday Island. Nov. Holl. legit Ferd. Müller! (hb. DC.)
- P. 181, lin. 3 alibique, *pro* foliigenæ *lege* phyllogenæ
- P. 181, n. 9, lin. 10, nerviformi productâ, *lege* nerviformi-productâ
- P. 182, n. 14, lin. 15, *pro* subintegrâ *lege* subintegræ
- P. 182, in char. Sect. III, *lege* phyllogenæ, et *adde* *Anisanthera* et ex parte *Omphalodaphne* Bl. l. c. p. 378 et 385.
- P. 183, n. 20, lin. 10, *pro* Pandjara *lege* Pantjara
- P. 185, n. 29, lin. 6, *pro* fulvo-canescens *lege* fulvo canescentes
- P. 185, n. 29  $\alpha$ , lin. 3, *lege* Wall. n. 2533!
- P. 185, n. 29  $\gamma$ , lin. 9, *pro* foliorum, *lege* foliis
- P. 186, n. 33  $\beta$ . Videtur species distincta, a typo satis discrepans costis vel omnibus vel saltem inferioribus non patulis, sed suberecto-adscendentibus, infimis multo longioribus longeque ultra laminæ medium excurrentibus. Baccæ magnit. pisi majoris, materiâ quadam exsudatâ albâ nitidulâ lamellosâ detergibili dense obductæ.
- P. 188, n. 40, T. ELLIPTICA Bl. *Adde*:  $\beta$  *sanguinea* (Hassk. cat. h. bogor. 1844, p. 90) « foliis junioribus atosanguineis, adultis paullo minoribus, nervis subtus magis prominulis venis transverse fenestratis. »
- P. 190, n. 45, *adde*: In Sumatrâ leg. Teysmann. Miq. suppl. p. 362, n. 298-299.
- P. 194, n. 49, lin. 7, *pro* intercostalis *lege* intercostalibus
- P. 192, n. 54. Cfr. Bonplandia 1861, p. 258. Arbor 15-20-ped., teste Seem. in hb. DC.

- P. 192, *adde* n. 54\*. *TETRANTHERA VITIANA*, glabra, foliis coriaceis immerso penninerviis e basi acutâ elliptico-oblongis breviter obtuseque acuminatis concoloribus opacis, supra eveniis, subtus dense vel obsolete immerso-reticulatis, umbellis fasciculatis. 5? in ins. Viti vel Fiji (Storck l.). — Seemann syst. list p. 10, n. 903! Ramuli tenues, epidermide cinereâ secedente mox atrofusci. Folia satis rigida, olivacea, 2-3-poll., 9-12 lin. lata, petiolo gracili 3-5-lin. canaliculato; costis utrinsecus 5-7 patulis evanescentibus cum nervo supra immersis vel sæpe obsolete subtus vix prominulis, venulis subtus subtilibus reticulatis vel utrinque oblitteratis. Umbellæ axillares, 2-5 in pedunculo communi vix 1 lin. longo fasciculatæ, pedunculis partial. 2-3 lin. longis tenuibus, invol. nondum expansis diam.  $1\frac{1}{2}$  lin. — Proxima T. Seemanni, sed distincta petiolo longiore, foliis tenuioribus utrinque subeveniis, costis magis patulis, umbellis fasciculatis. (v. s. in hb. DC.)
- P. 194, n. 60. Folia interdum acute acuminata. In Sumatræ occid. prov. Priaman. Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 361, cujus « var. minor » (Miq. l. c., vix non eadem ac  $\gamma$  pusilla nob.) e Sumatræ orient. prov. Palembang, omnino in T. variantem Bl. (nobis p. 194, n. 65) transire videtur, ex Miq. l. c.
- P. 195, n. 66. In ins. Philippinis legit Llanos! (h. DC.)
- P. 197, n. 77, *adde*: In Sumatrâ orient. Hassk. cat. h. Bogor. 1844, p. 90. Miq. suppl. p. 362.
- P. 197, n. 78, lin. 14 alibique, *pro* foliigena *lege* phyllogena
- P. 198, n. 82, lin. 9 alibique, *pro* florigenas *lege* floriparas, et *adde*:
- P. 198, n. 82\*. *TETRANTHERA? MERAWAS* (Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 362), « ramulis teretiusculis, foliis alternis coriaceis modice petiolatis e basi acutiusculâ vel subrotundatâ anguste ovato- vel elliptico-oblongis sublanceolatis breve submucronato-acuminatis acutise, supra præter nervum hirtellum mox glabris, subtus subrufis molliter pubescentibus (5-2 $\frac{1}{2}$  poll. long., 1 $\frac{1}{4}$ -1 poll. latis) costis utrinsecus 10-14 erecto-patulis parallelis ante marginem arcuatis sed non junctis transverse venosis et perspicue reticulatis, flor...? » — In Sumatræ austral. prov. Lampong (Teysm.). Prope T. Bancanam inserenda, ex Miq.
- P. 199, n. 89. T.? *CUBEBA*. Cfr. Loureiro in Mem. Acad. Lisb. 2, 1799, p. 82. *Tetrantheræ* speciebns non satis notis addendæ sunt:
90. T.? *SUBOVATA* (Miquel Fl. Ind. Bat. suppl. p. 362), foliis sparsis vel per intervalla confertioribus modice petiolatis coriaceis e basi cuneatâ oblongo-obovatis ex apice lato breviter acuteque apiculatis, supra depresso-costatis glabris, subtus pallidis cum petiolo ramulisque adpresse puberulis, umbellis pauci-fasciculatis breve pedunculatis, involucri 4-phyllo tomentello. — In Sumatræ orient. prov. Palembang (Teysm.). Folia 9-4-poll., interdum subobovata vel subcuneato-oblonga, subtus in sicco carnea, demum laxè venosa, petiolo 6-9 lin. longo subcylindrico canaliculato, costis utrinsecus 10-8 validis erecto-patulis pulvereo-puberulis demum glabrescentibus. Involucri foliola elliptica. Flores ignoti. — Ad T. angulatam (supra p. 197, n. 78) quodammodo accedit, ex Miq.
91. T.? *OCHRASCENS* (Miq. l. c. p. 363), foliis per intervalla confertioribus breviter petiolatis pergamaceis e basi acutâ vel obtusâ obovato-oblongis vel oblongis obtuse acuminatis laxè reticulatis, supra lucidis, subtus cum ramulis petiolis et nervis utrinque ochrascenti-tomentosis. — In Bangka (Teysm.). Petioli basi incrassati. Folia 11-7-poll., 5 $\frac{1}{2}$ -3 poll. lata, in sicco utrinque fusciscentia, costis utrinsecus circ. 12 patulis arcuato-adscendentibus, inferioribus magis approximatis tenerioribus magisque patentibus. Cæt. ignota.
92. T. *DIEPENHORSTII* (Miq. l. c. p. 363), foliis alternis modice petiolatis rigide chartaceis e basi acutâ elliptico-lanceolatis longe acuteque acuminatis supra nitidis glabris, subtus adpresse cinereo-pubescentibus, costis utrinque ochrascentibus, umbellis in pedunculo communi subfasciculatis, involucri 4-phyllo subglabro, pedicellis albido-hirtellis. — In Sumatræ occid. prov. Priaman (Diepenhorst). Folia 5-3-poll., costis utrinsecus 9-11. Pedunculi partiales pubescentes. Involucri foliola rotundo-ovata, subacuta, flor. masc. prævissime pedicellatis. Calyx brevi-campulatus, 6-partitus, lobis membranaceis obtusis basi extus villosulis, fundo cum filamentis hirtello. Anthere conformes, glabræ, exteriores 9 majores, valvulis sub-

- rotundis pallidis. Ab auctore sectioni suae Omphalodaphni (Conodaphni Nob.) adscribitur.
- P. 201, n. 1  $\beta$ , *addé* : in mont. Neilgherries, alt. 6-8000 ped. (Gardn.! Perrott. n. 999!), prope Mercara, Canara (Hohenack. n. 804!). Arbor procera.
- $\gamma$ , *acutata*, foliis ovato-vel elliptico-oblongis attenuato-acutiusculis (3-6-poll., 14-30 lin. latis) glabris passim subtus obsolete minuteque reticulatis. — In mont. Neilgherries circa Cadoo (Wight!). Cupula globoso-turbinata, in pedicellum crassiusculum attenuata et cum eo 5-6 lin. longa, diam,  $2\frac{1}{2}$  lin., ore paulo angustato integerrimo, baecá jun. inclusá. (v. s.)
- $\delta$ , *parvifolia*, foliis ovalibus oblongisque obtusis ( $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. longis) subtus fusco-tomentellis. — In mont. Neilgherries (Gardn.!). *C.* obtusifolia Nees! (manu proprio in hb. Mart., ex parte, sed a specim. Reinwardt diversissima).
- P. 202, n. 5, lin. 3, *pro minute lege minutá*
- P. 202, n. 8, *addé* *synon.* : *Quinquefolia* Noronha in Verhand. van het Batav. Genootsch. 5, p. 64 sq. ex Hassk. — In Sumatrâ, ex Miq. suppl. p. 361.
- P. 204, post n. 17, inseratur :
- 17\*. *C.?* *SELOANG* (Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 361, sub *Lepidadenia*), foliis per intervalla confertioribus modice petiolatis pergameis e basi acutá vel cuneatá lanceolato-oblongis vel obverse lanceolatis acuminatis, supra nitidis glabris, subtus adpresse puberulis subreticulatis. — In Sumatrâ orient. prov. Palembang. Ramuli novelli angulati, mox teretes, tenues, fuscescentes. Folia 6-3-poll.,  $2-4\frac{1}{2}$  poll. lata, nervo subtus basin versus acute prominente, costis utrinsecus 5-9 erecto-patulis teneris. *Cæt.* ign. Monente cl. auctore prope *C* tuberculatam collocanda.
- P. 207, n. 34. Crescit etiam in Sumatrâ (Teysm.) ex Miq. suppl. p. 361.
- P. 208, n. 35. In Sumatrâ austr. prov. Lampong (Teysm.). *Lepidadenia diversifolia* Miq. suppl. p. 361.
- P. 210. *DODECADENIA GRANDIFLORA* Nees. In Neesii syst. Laur. p. 588 legitur *synon.* : « *Laurus pubescens* Don prodr. in hb. Mart. (nec Don) » at in Donii prodr. hoc nomen nusquam occurrit et in herb. Mart. distinctissime legitimus : « *Laurus pallens* Don prodr. », sed et hoc nomen in Donii opere non occurrit; certissime saltem ad *Tetrantheram* pallentem Don prodr. p. 66 referri non potest.
- P. 214, n. 4 ( $\alpha$ ), *addé* : in collibus Moha, China (Park n. 127!). *Laurus rotundifolia* Wall., ex Steudel.
- P. 211, n. 2, *syn.* *Daphnidium lancifolium* Sieb. et Zucc. *addé* : *signum*!
- P. 214, n. 17, lin. 6, *pro* interdum rigida *lege* interdum cuneata, et *addé* : folia adulta præter nervi basin subtus pubescentem glabra, venulis subnullis. Miq. suppl. p. 363.
- P. 214, n. 18, lin. 9, claudatur parenthesis post 677.
- P. 216, n. 25, lin. 5, *lege* costis semierectis.
- P. 217, n. 33, *addé* : variat verticillis 7-phyllis, costis utrinsecus usque ad 15 (Miq. suppl. p. 363).
- P. 218, ante Sect. III, inseratur :
- 39\*. *ACTINODAPHNE GRACILIS* (Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 363), glabra, foliis longiuscule petiolatis chartaceis e basi acutá vel subcuneatá oblongo-lanceolatis, vel lanceolatis attenuato-acuminatis subtrineriviis margine undulatis, supra nitidis, subtus pallidioribus, nervo supra leviter prominulo. — In Sumatrâ orient. prov. Palembang (Teysm.). Ramuli tenues, teretes, glabri. Folia per intervalla longiora 5-7 subverticillata. Folia utrinque griseo-pallida, subtus vix discolora, 10-5 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 3-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, petiolo  $1\frac{1}{2}$ -1 poll. longo, costis utrinsecus 12-10, quarum utrinque una e basi orta reliquis sublongior magisque erecta, *Cæt.* ignota.
- P. 220, n. 1, *addé* : in Bangka (Teysm.) Miq. suppl. p. 364.
- P. 224, n. 16, *addé* :  $\gamma$  *incisa* (Ferd. Müll.! mss.), foliis profunde 2-3-fidis, lobis oblongis vel lanceolatis. — Ad Pine river, Moreton-Bay (F. Müll. nil nisi folia in hb. DC.)

- P. 226, n. 28, lin. 5, *lege* et in verticillis.
- P. 229, n. 3, lin. 5, *adde* : in Sumatrâ (Teysm.) fide Miq. suppl. p. 364.
- P. 230, n. 10, ad calcem *adde* : (v. s.)
- P. 233, n. 1,  $\gamma$ , *adde* : In hb. Schreberiano (nunc Monacensi) vidimus specimen in horto Chelsea cult. insigne foliis margine egregie undulato-crispulis. *Laurus undulata* Mill. ex Steudel.
- P. 233, n. 1,  $\delta$ , *adde* synon. : *Laurus tenuifolia* Mill. ? ex Steud.
- P. 234, sq. speciebus exclusis *adde* (ex Steudel.) :
- LAURUS ALBIDA Loudon. = *Sassafras albidum* Nees.
- LAURUS AMERICANA Mill. = *Daphnopsis tinifolia* Meissn. (Thymeleæ.)
- LAURUS CANALICULATA Rich. pl. Leblond, e Cayenne, in Act. Soc. hist. nat. par. p. 108.
- LAURUS DIFFORMIS Rich., pl. Leblond, e Cayenne, in Act. Soc. hist. nat. par. p. 108. = ?
- LAURUS NUTANS Isert. = *Phœbe Antillana*.
- LAURUS DISCOLOR Rich. pl. Leblond, e Cayenne, in Act. Soc. hist. nat. Par. 1792, p. 108. = *L. discolor* Willd. ? quæ *Nectandra discolor* Nees.
- LAURUS OCOTEA Rich. = *Oreodaphne Guianensis* Nees.
- LAURUS PUBERULA Rich. pl. Leblond, e Cayenne, in Act. Soc. hist. nat. Paris, 1792, p. 108. = *Strychnodaphne puberula* Nees ?
- LAURUS ROTUNDIFOLIA Wall. = *Actinodaphne Chinensis* Nees.
- LAURUS SAILIANA Spr. = *Cinnamomum Tamala* Nees.
- P. 240, sect. I, lin. 1, *lege* interiora 3 v. 2, etc.
- P. 241, n. 2, lin. 4, *adde* : *Laurus citriodora* Sieb. et Zucc. in hb. Zuccar.!
- P. 242, n. 8  $\beta$ , *adde* : *Polyadenia lucida*  $\beta$  Sumatrana Miq. Fl. Ind. Bat. suppl. p. 363?
- P. 244, n. 1, lin. 5, *lege* Citreæ v. Limoniæ folio, etc.
- P. 249, lin. 9, loco t. 298 *lege* p. 298.
- P. 254, n. 15, loco C. *Melantha lege* C. *melantha*
- P. 255, n. 19, *adde* : C. *filiformis* Miq. suppl. p. 364.
- P. 256, lin. 1, *lege*  $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$  lin. crassi.
- P. 259. Lauraceis nonnisi nomine (ex Steudelio) nobis cognitis addantur :
- Laurus canaliculata*, *difformis*, *discolor*, *pauperata* Rich. (Guianenses).
- Laurus atra*, *Canella*, *citriiformis*, *cordata*, *octandra*, *Mimosa*, *odoratissima*, *solaniiformis*, *subscandens* Vell. (omnes Brasilienses).
- Laurus aggregata* Sims, e Chinâ. *Tetrantherea* ?
- Laurus elegans* Blume. Java.
- Laurus nivea* Loddig.
- Laurus Sumatrensis* Ræusch.
- Laurus* (sphalmate) Engelmanni Steudel est *Lathyrus Engelmanni* Bisch. in Linnæâ, 14, Litt. Bericht, p. 132.
- CHIRÆA SALUTARIS Bert. (ex Rosenthal synops. pl. diaphoricar. 1, p. 238) dicitur Lauracea Austro-Africana nondum determinata, cujus corticis vires specificæ contra anginam perniciosam ibidem endemicam tribuuntur.
- CHRISTMANNIA CORONDI Dennst (Rheede Malab. 4, t. 50) a cl. Rosenthal l. c. 2, p. 4066 etiam inter Lauraceas enumerata, propter folia (ex ic. cit.) dentata et flores 5-meros, procul dubio alieni ordinis est.

## BEGONIACEÆ (1).

P. 330. *B. ROSACEA*. Nomen mutandum in *B. NOVO-GRANATÆ*, propter *B. roseam* Putz. n. 43.

P. 389, *adde* :

Sectio LVI *bis*. TETRAPHILA.

*Fl. masc.* Sepala 2. Petala 2. Stamina in conum ovoideum non stipitatum acervata; antheris oblongis, sessilibus. *Fl. fem.* Lobi 4, duobus interioribus angustioribus, Styli 4, basi connati, lineares, apice gradatim paulo latiores (nec capitati), interne apicem versus lineâ papillosâ donati. Ovarium elongatum, cylindricum, 4-loculare, exalatum. — Herba epiphyta, africana; foliis penninerviis; cymis axillaribus, abbreviatis; floribus roseis, unde (ut formâ stylorum et numero lorum fl. fem.) ab affini sectione Loasibegoniâ differt. — Nomen ex numero quaternario in floribus frequens.

309\* *B. MANNII* (Hook. Bot. Mag. 1864, t. 5434), caule erecto succoso, foliis ovato-oblongis cordatis acuminatis subæquilateralibus remote et irregulariter subdentatis subtus minute punctulato-squamulosis, petiolis costâque subtus rufo-hirsutulis, ovario minute squamuloso pubescente. ♀ In insulâ Fernando Po, alt. 1300 ped. (Mann), culta in h. Kew. Caulis 2-ped., glaber. Petioli 1-2 poll. longi. Limbi 4-5 poll. longi, 1½-2 poll. lati, supra glabri, subtus purpurascens. Stipulae lanceolatae, acuminatae, 9 lin. longæ. Pedunculi petiolo breviores. Petala masc. 4-5 lin. longa. Antheræ subacutæ. Capsula junior poll. longa, matura ignota.

P. 390. *B. PELTATA*. Nomen mutandum in *B. HASSKARLI* (Zoll. et Mor. Verz. p. 31) propter *B. peltatam* Schott. supra p. 368.

## PAPAYACEÆ.

P. 414. *PAPAYA VULGARIS*, *adde* : In Brasiliâ (Sellow! in h. r. berol. sub nom. ined. falso Kl.)

---

(1) Auctore Alph. DC.

REUOUEKE II  
 F. 200. B. REUOUEKE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 200.  
 Item p. 11.

IN 200. B. REUOUEKE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 200.  
 Item p. 11.

IT. 200. B. REUOUEKE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 200.  
 Item p. 11.

200. B. REUOUEKE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 200.  
 Item p. 11.

F. 200. B. REUOUEKE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 200.  
 Item p. 11.

PAPATARE

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

(1) Auctores Aiph. DC.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.

F. 212. PAPATARE, nomina munitum in B. XVO-GARATE, pagina p. 212.  
 Item p. 11.