

www.e-rara.ch

Monographie der Pseudophylliden

Brunner von Wattenwyl, Karl

Wien, 1895

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 14832

Persistent Link: <http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-72715>

Pantecphyli.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

5. *Capnoptera Donavani* Westw. *Clypeus cum basi labri infuscatus.*

Pronotum fulvum, margine postico fusco, integro. Elytra rufescentia, fascia longitudinali media flava (in ♀ in maculas magnas tres soluta), necnon punctis nigris irregulariter dispositis ornata, ramo radiali medio oriente. Alae elytris breviores, pallidae, venulis transversis fuscis, campo antico castaneo. Pectus latum. Lamina subgenitalis ♂ lata, bifida, stylis brevibus instructa. ♂, ♀.

	♂		♂
	(secundum imaginem apud Westwood)		
Long. corporis	35 mm		Lat. elytrorum medio 9 mm
" pronoti	8 "		Long. femorum posteriorum . . 13 "
" elytrorum	24 "		

Acanthodis Donavani Westw., 1848, *Oriental Ent.*, p. 51, Pl. 25, Fig. 2;
Donavan, *The Nat. Repository*, II, Pl. 69.

Patria: India orientalis (Westw.).

6. *Capnoptera Staudingeri* spec. nov. (Fig. 40.) *Colore fusco-*

castaneo vel nigro. Pronotum profunde fossulatum, inter fossula tuberculatum, margine postico triangulariter emarginato, lobis rotundatis. Elytra fusco-castanea, unicoloria vel nigra, praesertim in campo praeradiali striolis obliquis coeruleo-virescentibus signata. Alae subnigrae, venis nigris. Pedes atri. Abdomen unicolor fuscum. Lamina supraanalit ♂ brevis, transversa. Cerci breves, crassi, apice incurvi, mucronati. Lamina subgenitalis ♂ elongata, trapezoidea, leviter emarginata, stylis longis, acuminatis, superne excavatis instructa. Ovipositor pronoto duplo longior, falcatus. ♂, ♀.

	♂	♀		♂	♀
Long. corporis	26	39 mm		Long. fem. anterior. 9	11 —12 mm
" pronoti	4.5	5.6—7 "		" " postic.	11 19.8—21 "
" elytrorum	36	49 —53 "		" ovipositoris	— 16 "
Lat. elytror. medio	10	14 —16 "			

Patria: Borneo (Mus. I. R.), Kina Balu in insula Borneo (Coll. m., ab illustri Dr. Staudinger acquisita).

Pantecphyli.

Karsch hebt mit Recht die in jeder Beziehung abweichende Form des afrikanischen Genus *Pantecphyllus* hervor, welches mit den *Acanthoden* den durch Stacheln gekrönten Hinterrand des Pronotum gemein hat, jedoch durch die Form der Brust entschieden der ersten Abtheilung angehört.

Mit diesem abnormen Genus vereinige ich das von mir beschriebene Genus *Phanerotus*¹⁾ und erhalte hiedurch eine kleine Gruppe, die von den *Cymatomeren* durch die konische Kopfform abweicht und sich somit zu diesen verhält wie die *Phyllomimi* zu den *Pseudophylli*.

¹⁾ Rév. du système, p. 178.

• 41. Genus. *Pantecphylyus* Karsch.

Caput parvum conicum. Fastigium verticis triangulare, concavum, margines scrobium antennarum haud superans. Antennae unicolores, corpore haud longiores, articulo basali spinoso. Oculi globosi. Pronotum magnum, antice gibboso-elevatum, tumore medio depresso, utrinque in spinam terminato, disco constricto, sulcis transversis profunde incisus, metazona horizontaliter expansa, margine postico rotundato et longe spinoso, disco toto granuloso, lobis deflexis subperpendicularibus, margine inferiore leviter rotundato, angulo postico in spinam producto. Elytra opaca, cornea, secundum venam ulnarem anteriorem angulo acuto fracta, parte praeculnari verticaliter deflexa, parte postcubitali horizontaliter expansa, venis radialibus valde remotis, ramo radiali nullo. Alae breves, late rotundatae, infuscaatae. Prosternum muticum. Pectus latum. Meso- et metasternum transversa, triplo latiora quam longiora. Mesosternum margine antico recto. Mesopleurae in angulo antico spina acuta armatae. Pedes breves. Femora antica superne deplanata, obtuse tuberculata, subtus in utroque margine spinulosa. Femora postica compressa, superne carinata, subtus in margine externo 8- ad 10-spinulosa. Lobi geniculares omnes obtusi. Tibiae anticae utrinque conchis adpressis constructa. Tibiae intermediae et posticae superne in utroque margine multo spinulosae. Cerci ♂ breves, incurvi, mucronati. Lamina subgenitalis ♂ ante apicem angustata, rotundato emarginata, stylis brevibus, subuncinatis instructa. Ovipositor incurvus, acuminatus. ♂, ♀.

Pantecphylyus Karsch, 1890, Berliner ent. Nachr., XVI, S. 274.

Pantecphylyus Karsch, Berliner ent. Zeitschr., 1891, XXXVI, S. 99.

Species unica.

• 1. *Pantecphylyus cerambycinus* Karsch. (Fig. 41.) Olivaceo flavescens vel opaco-castaneus. Frons in margine inferiore et clypeus cum labro nigri nitidi. Elytra prope basin macula lactea, interdum in punctum reducta signata. Segmenta abdominalia dorsalia margine postico nigro, nitido, ventralia tota nigra. Ovipositor, excepta basi, niger, nitidus. ♂, ♀.

	♂	♀
Long. corporis	28	32 mm
„ pronoti	10	11 —13 „
„ elytrorum	22	25 —32 „
Lat. elytrorum medio (partis deflexae solae)	8	9.5—12 „
Long. femorum anticorum	8	8.5—11 „
„ „ posticorum	13.5	15 —17 „
„ ovipositoris	—	14.5—19 „

Pantecphylyus cerambycinus Karsch, 1891, Berliner ent. Zeitschr., XXXVI, S. 100, Taf. III, Fig. 11.

Patria: Kamerun (Karsch, Coll. Dohrn).

Ich bin im Zweifel, ob nicht zwei Species gemischt sind.

. 42. Genus. *Phanerotus* Br.

Caput conicum. Fastigium verticis triangulare, sulcatum, apice emarginatum, margines scrobium antennarum valde superans. Antennae annulatae, articulo basali breviter dentato. Pronotum amplum, semicylindricum, antice et postice truncatum, rugosum, sulcis transversis valde remotis, lobis deflexis multo longioribus quam altioribus, margine inferiore recto. Elytra sublobiformia. Alae nullae. Femora gracilia, antica subtus mutica, intermedia et postica undulato-dilatata. Tibiae anticae superne planae, foveolis apertis. Tibiae intermediae compressae, superne muticae, posticae haud compressae, superne minutissime spinulosae. Prosternum muticum. Pectus latissimum. Mesosternum quadruplo latius quam longius, margine antico rotundato, angulis obtusis. Abdomen carinatum. Lamina supraanalis ♂ triangulata. Cerci ♂ breves, apice incurvi, acuminati. Lamina subgenitalis ♂ trapezoidea, angustata, stylis teretibus, longis instructa. Ovipositor brevis, subrectus, acuminatus. Lamina supraanalis ♀ elongata, elliptica. Lamina subgenitalis ♀ truncata. ♂, ♀.

Phanerotus Brunner, 1893, Rév. du système etc., p. 178.

Dispositio specierum.

1. Colore fusco-castaneo. Elytra apice rotundata, macula sulphurea magna mediana ornata. Femora postica subtus rotundato-undulata.

1. *opacus* Br.

1'. Colore fusco-ferrugineo. Elytra unicoloria, apice acuminata. Femora postica subtus acute undulata.

2. *ferrugineus* spec. nov.

1. *Phanerotus opacus* Br. (Fig. 42.) Colore fusco-castaneo vel nigro. Elytra marginem posticum segmenti abdominalis primi haud attingentia, vix incumbentia, apice rotundata, disco macula sulfurea magna ornato (interdum oblitterata). Femora postica subtus rotundato-undulata. ♂, ♀.

	♂	♀		♂	♀
Long. corporis	35	40 mm		Long. femor. posticor.	15 16.5 mm
" pronoti	7.8	8 "		" ovipositoris	— 17 "
" elytrorum	13.5	10 "			

Phanerotus opacus Brunner, 1893, Rév. du système etc., p. 178, Pl. VI, Fig. 63.

Patria: Birmania (Brunner).

2. *Phanerotus ferrugineus* spec. nov. Colore fusco-ferrugineo. Elytra unicoloria, acuminata, margine postico segmentum abdominale primum superante. Femora postica subtus angulato-undulata. ♂, ♀.

	♂	♀		♂	♀
Long. corporis	26	30 mm		Long. femor. posticor.	12 15 mm
" pronoti	5.5	7 "		" ovipositoris	— 17 "
" elytrorum	10	10 "			

Patria: Hongkong, Insula Luzon, Cambodja (Coll. m.).