

www.e-rara.ch

Monographie der Pseudophylliden

Brunner von Wattenwyl, Karl

Wien, 1895

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 14832

Persistent Link: <http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-72715>

Aphracti.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Aphracti.

Diese erste Gruppe der zweiten Abtheilung mit gekreuzten Furchen der Vorderbrust zeigt einige Abnormitäten. Die Füße sind überaus schlank, die Schenkel sind unbedornt und die Gehörgrübchen der Vorderschienen sind offen. Die zwei hierher gehörenden Genera finden sich in Chile.

43. Gen. nov. *Aphractus* Redt.

(ἄφρακτος — non munitus.)

Colore pallide testaceo. Caput conicum. Fastigium verticis acuminatum, sulcatum. Antennae unicolores, fortiores, articulo basali mutico. Pronotum elongatum, semicylindricum, sulcis transversis subdeletis, lobis deflexis humilimis, margine inferiore recto. Elytra longa, acuminata vel valde abbreviata. Alae suboblitteratae. Prosternum bispinosum. Meso- et metasternum transversa, illud margine antico recto, hoc foveolis inter se magis remotis quam a margine. Pedes gracillimi, pilosi. Femora omnia inermia, antica curvata, postica basi vix incrassata. Tibiae anticae utrinque foramine aperto instructae, inermes. Segmenta abdominalia dorsalia in margine postico tridentata. Lamina supra-analis ♀ brevis rotundata. Ovipositor rectus vel subrectus, acuminatus, utroque margine integro. Lamina subgenitalis ♀ brevis, triangularis, emarginata. ♀

Dispositio specierum.

1. Elytra abdomen superantia. Ovipositor margine superiore recto.

1. acuminatus spec. nov.

1'. Elytra segmentum abdominale secundum haud superantia. Ovipositor margine superiore subsinuato.

2. abbreviatus spec. nov.

1. *Aphractus acuminatus* spec. nov. (Fig. 43.) Pallide testaceus. Pronotum margine antico rotundato, integro, margine postico leviter rotundato. Elytra longa, acuminata, venis radialibus a basi discontiguis, ramo radiali longe pone medium oriente. Alae breves, venulis transversis nigro-circumdati. Lobi geniculares femorum posticorum rotundati, adpressi. Ovipositor pronoto duplo longior, rectus, disco laevi. ♀.

Long. corporis	♀ 25 mm	Long. femorum anticorum . . .	♀ 13.5 mm
" pronoti	6.5 "	" " posticorum	21 "
" elytrorum	39 "	" ovipositoris	14.5 "

Patria: Chile (Coll. m.).

2. *Aphractus abbreviatus* spec. nov. Pallide testaceus. Pronotum planiusculum, subtricarinarum, margine antico rotundato et trituberculato, margine postico truncato. Elytra segmentum abdominale tertium haud superantia, apice obtusa, venis longitudinalibus omnibus parallelis. Femora postica lobis genicularibus acuminatis instructa. Ovipositor margine superiore subsinuato, disco ruga unica apicali instructo. ♀.

	♀		♀
Long. corporis	23 mm		Long. femorum anticorum 9.5 mm
" pronoti	5.5 "		" " posticorum 15 "
" elytrorum	7.5 "		" ovipositoris 11 "
Patria: Chile (Coll. m.).			

44. Genus. *Polycleptis* Karsch.

Caput globosum. Fastigium verticis triangulare, sulcatum. Antennae nigro et testaceo variegatae, articulo basali dentato. Pronotum sellatum, margine antico supra caput producto et tridentato, metazona adscendente, margine postico obtuso, triangulari et tuberculato. Elytra valde abbreviata, venis radialibus a basi remotis, campo tympanali in ♂ magno, in utroque elytro speculo et venis elevatis instructo. Alae elytris breviores, lobiformes. Prosternum bispinosum. Pectus latum. Metasternum foveolis inter se magis remotis quam a margine. Pedes graciles. Femora omnia compressa, pilosa, subtus mutica, postica subtus leviter undulata. Tibiae anticae inermes, foveolis apertis. Tibiae intermediae superne bidentatae. Tibiae posticae superne utrinque dentibus deplanatis, triangularibus armatae. Segmenta abdominalia dorsalia in margine postico dentata. Cerci ♂ teretes, apice incurvi et mucronati. Lamina supranalis ♂ rotundata. Lamina subgenitalis ♂ plana, apice parum attenuata, stylis minimis instructa. Ovipositor rectus vel margine superiore leviter sinuato, medio crenulato. ♂, ♀.

Polycleptis Karsch, 1891, Ent. Nachr., XVII, S. 105.

Dieses Genus, welches Karsch in die Zunft der Prochiliden verlegt, gehört unzweifelhaft hierher.

Dispositio specierum.

1. *Statura obesiore*. Ovipositor rectus, pronoto duplo longior. Lamina subgenitalis ♂ stylis longioribus instructa. 1. *scutellifera* Karsch.
 1'. *Statura graciliore*. Ovipositor incurvus, pronoto duplo haud longior. Lamina subgenitalis ♂ stylis brevibus instructa. 2. *inermis* Karsch.

1. *Polycleptis scutellifera* Karsch. Obesa. Sordide fusco-testacea, opaca, flavo-maculata. Antennae flavo-annulatae. Elytra campo praeradiali in ♂ pallide flavo, punctis nigris in areolis signato. Lamina subgenitalis ♂ margine postico late sinuato, stylis productis instructa. Ovipositor subrectus, nitidus, apice niger. ♂, ♀.

	♂	♀		♂	♀
Long. corporis	23	27.5 mm		Long. femor. anticor.	10 12 mm
" pronoti	5	6.8 "		" " posticor.	16 17 "
" elytrorum	8	9 "		" ovipositoris	— 15.5 "
Lat. elytrorum medio	6	5 "			

Polycleptis scutellifera Karsch, 1891, Ent. Nachr., XVII, S. 106.

Patria: Chile (Karsch).

2. *Polycleptis inermis* Karsch. (Fig. 44.) *Gracilior. Differt a specie praecedente ovipositore brevior et subincurvo et lamina subgenitali ♂ stylis parum productis.* ♂, ♀.

	♂	♀		♂	♀
Long. corporis	23	27.5	mm	Long. femor. anticor. . . .	8.5 9
" pronoti	5	6.5	"	" " posticor.	14 15
" elytrorum	7	6	"	" ovipositoris.	— 12.3
Lat. elytrorum medio . . .	5	3	"		

Polycleptis inermis Karsch, 1891, Ent. Nachr., XVII, S. 107.

Patria: Chile (Karsch, Coll. m.).

Acanthodes.

Der Kopf ist kurz, der Scheitelgipfel überaus klein und erreicht nicht den Vorderrand der Fühlergruben. Das Pronotum ist kurz und meistens rückwärts aufgebogen. Die Deckflügel sind rauh durch die erhabenen Adern. Das Tympanalfeld der Männchen ist stark ausgebildet und besitzt auf beiden Flügeln, mit wenigen Ausnahmen, eine glashelle Membran. Die halbkreisförmigen Hinterflügel sind stets kürzer als die Deckflügel und haben daher den Vorderrand abgerundet. Sie sind stets angeraucht und die Queradern sind öfters mit dunklem Pigment umgeben. Das Prosternum ist stets bedornt. Die Brust ist breit, die Sterna sind transversal, die Furchen des Mesosternum gekreuzt und die Grübchen des Metasternum weit auseinandergerückt. Charakteristisch sind die langen Beine. Die Hinterschenkel sind an der Basis stark verdickt, aber sehr schlank gegen die Spitze und auf der Unterseite stets bedornt. Die Vorderschienen bieten keine Genuscharaktere, dagegen werden in dieser Gruppe zuerst die Mittelschienen zur Unterscheidung der Genera verwendet, und zwar durch die Art der Bedornung auf der Oberseite. Die männliche Lamina subgenitalis ist kurz, wenig verjüngt, trägt lange, cylindrische Griffel und bietet keine generischen Anhaltspunkte. Die Legescheide ist kräftig, gerade und auf der Oberseite von der Mitte an schräg abgestutzt, selten sichelförmig.

45. Genus. *Xeropteryx* Redt.

(ἕρηρος — siccus, πτέρυξ — ala.)

Caput globosum. Fastigium verticis brevissimum, nodulosum, margines scrobium antennarum haud attingens. Antennae articulo basali dentato. Pronotum planiusculum, parum rugosum, antice longe supra caput productum, margine antico elliptico, margine postico subtruncato, callo intramarginali instructo, lobis deflexis humilibus. Elytra ampla, venis elevatis scabra, campo praeradiati extenso, vena mediastina elongata et flexuosa, venulas transversas parallelas (praecipue in ♂ distinctas) versus marginem emittente, venis radialibus