

www.e-rara.ch

Tome premier.

II. Sphaeroderius.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

Élytres plus bronzées, moins convexes, plus allongées, avec les trois lignes de points plus marquées, surtout vers l'extrémité.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il habite la Géorgie et les montagnes du Caucase.

II. SPHÆRODERUS. *Dejean.*

CYCHRUS. *Weber. Schænherr. Say.*

Les trois premiers articles des tarsi antérieurs dilatés dans les mâles : les deux premiers très-fortement, le troisième beaucoup moins. Dernier article des palpes très-fortement sécuriforme, presque en forme de cuiller, et plus dilaté dans les mâles. Antennes filiformes. Lèvre supérieure bifide. Mandibules étroites, avancées et dentées intérieurement. Menton très-fortement échancré. Corselet arrondi et nullement relevé sur les côtés. Élytres soudées, carénées latéralement et embrassant une partie de l'abdomen.

Les insectes qui forment ce genre ont les plus grands rapports avec les *Cychnus*, et ils ont été jusqu'à présent confondus avec eux; mais ils paraissent en différer tellement que M. Dejean n'a pas cru pouvoir se dispenser de les séparer. Leur taille est plus petite. Ils s'éloignent un peu, par leur *facies*, des véritables *Cychnus*, et, à la première vue, ils paraissent se rapprocher de quelques petites espèces de *Carabus*, et surtout du *Convexus*. La tête est un peu moins allongée. Les antennes sont un peu plus

courtes et un peu moins déliées. Le corselet est convexe, arrondi, ovale ou orbiculé; ce que l'on a voulu exprimer par le nom *Sphæroderus*, tiré des deux mots grecs Σφαῖρα, sphère, globe, et Δέρων, col, et il n'est nullement relevé sur les côtés postérieurement. Les élytres sont proportionnellement moins grandes que celles des *Cychrus*, et elles sont un peu moins convexes. Les pattes sont un peu plus courtes et un peu plus fortes. Les deux premiers articles des tarsi antérieurs des mâles sont très-fortement dilatés: le premier en trapèze ou triangle tronqué, et le second presque en carré moins long que large; le troisième article est presque cordiforme, et il est aussi dilaté, mais beaucoup moins que les deux premiers.

Les espèces de ce genre sont de l'Amérique septentrionale.

S. LECONTEI.

Pl. 29. fig. 2.

Niger; thorace cyaneo, ovato, postice transverse lineaque utrinque impressis; elytris oblongo-ovatis, subcupreis, antice striato-punctatis, postice granularis, margine cyaneo.

DEJ. Spec. II. p. 15. n° 1.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, où il a été découvert par M. Leconte.