www.e-rara.ch

Tome premier.

VII. Procrustes.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Visual Library

des Naturalistes de Moscou. v. p. 282. n° 6. t. 10. fig. 3. 6.

Carabus Scabrosus. Fischer. *Entomographie de la Russie.* i. p. 13. n° 1. t. 2. fig. c. c.

Long. 18 lignes. Larg. 7 $\frac{1}{2}$ lignes.

D'une belle couleur bleue en dessus, plus petit et plus convexe que le *Tauricus*, et se rapprochant un peu de la forme du *Scabrosus*.

Corselet se rapprochant un peu, par la forme, de celui du *Scabrosus*, moins large, plus rétréci antérieurement, plus court et plus large postérieurement, et beaucoup plus étroit antérieurement que celui du *Tauricus*.

Élytres un peu plus courtes et plus convexes que celles du *Tauricus*, avec les points élevés un peu moins serrés, non rangés en lignes droites, et plus éloignés les uns des autres que dans les espèces précédentes.

Dessous du corps et pattes comme dans le *Tauricus*.

Il se trouve au Caucase.

VII. PROCRUSTES. *Bonelli.*

Carabus. *Fabricius.*

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les mâles; les trois premiers très-fortement, le quatrième beaucoup moins. Dernier article des palpes fortement sécuriforme et plus dilaté dans les mâles. Antennes filiformes. Lèvre supérieure trilobée. Mandibules légèrement arquées, très-aiguës, lisses, et n'ayant qu'une dent à

leur base. Une très-forte dent bifide au milieu de l'échancrure du menton. Corselet cordiforme. Élytres en ovale allongé.

Ce genre a été établi par Bonelli sur le *Carabus Coriaceus* de Fabricius, et il a été depuis adopté par presque tous les entomologistes. Les *Procrustes* ont les plus grands rapports avec les *Carabus*, et ils en diffèrent seulement par la lèvre supérieure, qui est distinctement trilobée, tandis qu'elle est bilobée dans les *Carabus;* et par la dent qui se trouve au milieu de l'échancrure du menton, qui est bifide, tandis qu'elle est simple dans les *Carabus*. Bonelli dit aussi que les côtés du menton sont tronqués et presque échancrés au lieu d'être arrondis, et que le second et le quatrième article des antennes, dont le premier est un peu plus long, sont plus courts que les autres, qui sont égaux entre eux; au lieu que dans les *Carabus* le second est égal au quatrième, et le premier et le troisième sont les plus longs. Mais ces derniers caractères ont paru très-difficiles à saisir, et ne sont même pas constans dans toutes les espèces. Pendant long-temps on n'a connu qu'une seule espèce de ce genre, qui est très-commune dans toute l'Europe. M. Dejean a trouvé en Dalmatie deux autres espèces très-voisines de la première, qui n'en sont peut-être même que des variétés, et l'on a reçu depuis de la Grèce et de l'Asie-Mineure plusieurs espèces nouvelles.

1. P. Coriaceus.

Pl. 32. fig. 1.

Niger, oblongo-ovatus; elytris punctis intricatis rugosis.

Dej. *Spec.* II. p. 27. n° 1.
Bonelli. *Observations entomologiques.* 1. p. 22. n° 1.
Sturm. III. p. 22. n° 1. t. 54.
Dej. *Cat.* p. 5.
Carabus Coriaceus. Fabr. *Syst. El.* I. p. 168. n° 2.
Oliv. III. 35. p. 18. n° 9. t. 1. fig. 1. a. b.
Sch. *Syn. Ins.* 1. p. 167. n° 2.
Gyllenhal. II. p. 54. n° 1.
Duftschmid. II. p. 19. n° 2.
Le Bupreste noir chagriné. Geoff. I. p. 141. n° 1.

Long. 15, 17 lignes. Larg. 6, 7 lignes.

D'un noir opaque un peu luisant en dessus.

Tête allongée, presque lisse, avec les antennes de la longueur de la moitié du corps.

Corselet plus large que la tête, un peu en cœur, légèrement échancré antérieurement et postérieurement, avec les bords latéraux un peu relevés surtout vers les angles postérieurs.

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, et entièrement couvertes de points enfoncés, irréguliers, assez serrés, qui se confondent entre eux et les font paraître chagrinés, ordinairement sans ordre, mais formant

dans quelques individus trois lignes de points enfoncés peu apparens.

Dessous du corps et pattes d'un noir plus brillant que le dessus.

Il se trouve communément en France, en Allemagne, en Suède, dans les bois, les champs et les jardins.

2. P. Spretus.

Pl. 32. fig. 2.

Niger, oblongo-ovatus; elytris punctis intricatis subrugosis, punctisque obsoletis impressis triplici serie.

Dej. *Spec.* II. p. 29. n° 2.

Dej. *Cat.* p. 5.

P. Bannaticus. Dahl. *Coleoptera und Lepidoptera.* p. 3.

P. Coriaceus? var. Bonelli. *Observations entomologiques.* I. p. 22. n. 1.

Long. 13, 16 lignes. Larg. 5, 6 $\frac{1}{2}$ lignes.

Probablement variété locale du précédent, mais ordinairement un peu plus petit.

Corselet plus lisse.

Élytres moins profondément ponctuées, leurs points se confondant moins entre eux, constamment trois lignes de points enfoncés, mais peu distinctes.

Il se trouve en Dalmatie, dans le Bannat et dans quelques îles de la Grèce.

3. P. Rugosus.

Pl. 32. fig. 3.

Niger, elongato-ovatus ; elytris punctis intricatis rugosis.

Dej. *Spec.* II. p. 29. n° 3.
Dej. *Cat.* p. 5.

Long. 13, 14 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 4 $\frac{3}{4}$, 5 $\frac{1}{2}$ lignes.

Peut-être aussi variété locale du *Coriaceus*, un peu plus petit, plus étroit et plus allongé; d'une couleur plus luisante, quelquefois légèrement bleuâtre sur les bords des élytres.

Corselet un peu plus lisse, avec les bords un peu plus relevés vers les angles postérieurs.

Élytres un peu plus allongées, plus étroites, moins convexes et ponctuées comme dans le *Coriaceus*.

Il se trouve en Dalmatie, particulièrement aux environs de Vergoraz. B. D.

4. P. Foudrasii. *Solier.*

Pl. 32. fig. 4.

Niger, elongato-ovatus; elytris punctatis, punctisque obsoletis impressis triplici serie.

Long. 13 $\frac{1}{2}$, 15 lignes. Larg. 5, 6 lignes.

A peu près de la grandeur du *Spretus*, et un peu plus allongé.

Corselet un peu plus lisse, un peu moins large antérieurement; ce qui le fait paraître moins rétréci postérieurement.

Élytres un peu plus allongées, moins convexes, et couvertes de points enfoncés moins marqués, moins rapprochés, et qui se confondent moins entre eux; les trois lignes de points enfoncés un peu plus distinctes.

Il se trouve assez communément en Morée, et il m'a été envoyé par M. Solier, sous le nom que je lui ai conservé.

5. P. Græcus. *Parreyss.*

Pl. 33. fig 1.

Niger, elongato-oblongus; elytris punctis intricatis subrugosis.

Long. 12 $\frac{1}{2}$, 14 $\frac{3}{4}$ lignes. Larg. 4 $\frac{1}{2}$, 5 $\frac{1}{3}$ lignes.

A peu près de la grandeur du *Rugosus*, mais plus étroit et plus allongé.

Corselet plus carré, moins large antérieurement, et à peine rétréci postérieurement.

Élytres plus étroites, plus allongées, et couvertes de points enfoncés moins marqués, plus distincts et qui se confondent moins entre eux.

Il m'a été envoyé par M. Parreyss comme venant des îles Ioniennes.

C. D.

6. P. Cerisyi.

Pl. 33. fig. 2.

Niger, oblongo-ovatus; elytris punctatis sublævibus.

Dej. *Spec.* II. p. 30. n° 4.

Long. 12, 13 $\frac{1}{3}$ lignes. Larg. 4 $\frac{3}{4}$, 5 $\frac{1}{3}$ lignes.

Plus petit que le *Coriaceus*, proportionnellement plus court et plus large.

Corselet plus lisse, avec les bords plus relevés vers les angles postérieurs.

Élytres un peu moins allongées et un peu plus larges, beaucoup plus lisses, avec des points enfoncés, petits, peu marqués et presque rangés en stries, et, en outre, quelques vestiges de lignes de points enfoncés, mais très-peu marqués.

Il se trouve dans l'île de Mytilène et dans l'Asie-Mineure.

B. D.

7. P. Banonii. *Dupont.*

Pl. 33. fig. 3.

Niger, oblongo-ovatus; thorace marginato, subrotundato, antice posticeque subemarginato; elytris subtilissime rugosis.

Long. 11, 13 lignes. Larg. 4 $\frac{1}{3}$, 5 $\frac{1}{2}$ lignes.

A peu près de la grandeur du *Cerisyi*, est très-différent de toutes les espèces précédentes.

Corselet légèrement ridé, large, assez court, presque transversal, arrondi sur les côtés, assez échancré antérieurement et beaucoup plus postérieurement; bords latéraux relevés.

Élytres plus larges antérieurement, plus parallèles que dans toutes les espèces précédentes et entièrement couvertes de très-petits points élevés, très-serrés, presque triangulaires, un peu relevés de la pointe, et ayant presque la forme des aspérités d'une rape.

Il se trouve dans les îles et sur le continent de la Grèce.

C. D.

VIII. CARABUS. *Linné. Fischer.*

Tachypus. *Weber.* Plectes. Cechenus. *Fischer.*

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les mâles; les trois premiers très-fortement, le quatrième souvent un peu moins. Dernier article des palpes plus ou moins sécuriforme et plus dilaté dans les mâles. Antennes filiformes; le troisième article cylindrique et à peine plus long que les autres. Lèvre supérieure bilobée. Mandibules légèrement arquées, plus ou moins aiguës, lisses et n'ayant qu'une dent à leur base. Une très-forte dent au milieu de l'échancrure du menton. Corselet plus ou moins cordiforme. Élytres en ovale plus ou moins allongé. Jamais d'ailes propres au vol.

Le genre *Carabus* de Linné comprenait tous les insectes de cette famille, à l'exception de ceux qu'il avait placés