

www.e-rara.ch

Tome premier.

Seconde division.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

dessin à peu près comme dans le *Dalmatinus*, mais moins régulier.

Découvert par M. Dejean, sous les mousses au pied des arbres, dans les montagnes de la Croatie militaire.

SECONDE DIVISION.

4. C. ILLIGERI.

Pl. 55. fig. 5.

Oblongo-ovatus, supra cyaneo-violaceus; thorace punctato, subrugoso; elytris punctis oblongis elevatis per strias dispositis.

DEJ. *Spec.* II. p. 41. n° 4.

Long. 13, 14 lignes. Larg. $4\frac{3}{4}$, $5\frac{1}{4}$ lignes.

D'une belle couleur bleue un peu violette. Tête et antennes à peu près comme dans le *Scheidleri*.

Corselet un peu plus grand, plus large, plus carré, presque chagriné.

Élytres un peu plus larges antérieurement, moins ovales et plus parallèles, couvertes de points élevés, oblongs et irréguliers, rangés en stries, quelques-uns par leur allongement formant presque des stries.

Dessous du corps et pattes d'un noir assez brillant.

Il habite les montagnes de la Croatie.

5. C. KOLLARI.

Pl. 35. fig. 4.

Ovatus, supra cyaneo-violaceus, vel virescens; elytris striato-punctatis, interstitiis elevatis, interruptis.

DEJ. *Spec.* II. p. 42. n° 5.

DAHL. *Coleoptera und Lepidoptera.* p. 4.

PALLIARDI. *Beschreibung zweyer decaden neuer und wenig bekannter Carabiden.* p. 7. T. 1. fig. 3.

Long. 13, 14 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 5, 5 $\frac{3}{4}$ lignes.

Ressemble un peu, au premier coup-d'œil, au *Catenatus*, surtout par sa couleur, qui varie du bleu-violet au verdâtre, avec les bords latéraux violets; mais, pour sa forme et par le dessin des élytres, il se rapproche beaucoup plus du *Scheidleri*.

Tête et corselet comme dans cette dernière espèce, seulement un peu plus larges.

Élytres plus larges, avec les stries plus profondes, les points enfoncés moins distincts, et les intervalles plus saillans, plus distinctement et plus fréquemment interrompus.

Pattes et dessous du corps d'un noir luisant.

Il se trouve dans la Valachie et les montagnes du Bannat.

6. C. SCHEIDLERI.

Pl. 36. fig. 1.

Oblongo-ovatus, supra viridi-æneus, vel violaceus; elytris striato-punctatis, interstitiis subelevatis, interruptis.

DEJ. *Spec.* II. p. 42. n° 6.

FABR. *Syst. El.* 1. p. 174. n° 24.

SCH. *Syn. Ins.* 1. p. 172. n° 28.

DUFTSCHMID. II. p. 25. n° 12.

STURM. III. p. 80. n° 29.

DEJ. *Cat.* p. 5.

VAR. A. C. *Purpuratus*. STURM. p. 77. n° 27. T. 60.
fig. b. B.

DEJ. *Cat.* p. 5.

VAR. B. C. *Virens*. STURM. p. 107. n° 45. T. 65. fig. a. A.

VAR. C. C. *Æneipennis*. STURM. p. 83. n° 31. T. 62.
fig. a. A.

Long. 11, 14 lignes. Larg. 4, 5 $\frac{1}{2}$ lignes.

Variable pour la couleur et même pour le dessin des élytres.

A peu près de la taille du *Monilis*, et d'une couleur qui varie en-dessus du bleu légèrement verdâtre ou purpurin au violet un peu foncé, et du vert métallique clair au bronzé cuivreux.

Tête légèrement ponctuée et ridée, avec les antennes brunâtres, à l'exception des quatre premiers articles, qui sont noirs.

Corselet à peu près moitié plus large que la tête, moins long que large, presque carré, très-peu convexe, légèrement ponctué et ridé, légèrement échancré antérieurement.

Élytres plus larges que le corselet et en ovale allongé, avec des stries assez profondes, ponctuées plus ou moins profondément et plus ou moins régulièrement; les intervalles un peu relevés, plus ou moins ponctués et plus ou moins interrompus, avec une ligne de points enfoncés ordinairement assez distincts sur les quatrième, huitième et douzième.

Dessous du corps et pattes d'un noir assez brillant.

Il se trouve assez communément en Autriche et en Hongrie.

Les individus qui se trouvent aux environs de Vienne sont ordinairement d'un bleu-violet plus ou moins foncé, quelquefois un peu pourpré. Les stries des élytres sont régulièrement ponctuées, les intervalles ont seulement quelques points enfoncés, à l'exception des quatrième, huitième et douzième, qui sont interrompus. C'est le *Carabus Purpuratus* de Sturm.

Ceux que l'on trouve aux environs de Linz, dans la haute Autriche, sont semblables à ceux-ci par le dessin des élytres; mais ils sont ordinairement d'un vert un peu bronzé. C'est d'après eux que M. Duftschmid a fait la description du *Scheidleri*.

Ceux que l'on regarde à Vienne comme le véritable *Scheidleri*, et qui se trouvent en Autriche, mais plus souvent en Hongrie, sont ordinairement d'une couleur bronzée, plus ou moins obscure, quelquefois un peu

cuivreuse, avec les bords du corselet et des élytres d'un violet un peu cuivreux. Les stries sont moins régulièrement ponctuées, et les intervalles sont beaucoup plus ponctués et plus interrompus.

Le *Virens* de Sturm se trouve en Hongrie; il est ordinairement un peu plus grand; il varie pour la couleur; les stries des élytres sont encore moins régulièrement ponctuées, et les intervalles sont plus petits, mais distincts et plus interrompus.

Il n'y a rien de constant dans toutes ces variétés, et l'on trouve toujours des passages de l'une à l'autre, de manière qu'après avoir examiné un grand nombre d'individus il est impossible de les séparer et d'en faire des espèces distinctes.

7. C. PREYSSLERI.

Pl. 56. fig. 2.

Oblongo-ovatus, nigro-subcyaneus; thoracis elytrorumque margine violaceo; elytris subtiliter striato-punctatis, interstitiis punctulatis.

DEJ. *Spec.* II. p. 45. n° 7.

DUFTSCHMID. II. p. 26. n° 13.

STURM. III. p. 91. n° 36. T. 63. fig. b. B.

DEJ. *Cat.* p. 5.

Long. 12, 13 lignes. Larg. $4\frac{1}{2}$, 5 lignes.

Ressemble beaucoup à la variété *Purpuratus* du *Scheidleri*, et il n'est peut-être qu'une des nombreuses variétés

de cet insecte, dont le dessin des élytres serait moins fortement marqué.

D'un noir un peu bleuâtre, avec les bords latéraux du corselet et des élytres d'un bleu un peu violet, quelquefois entièrement d'un bleu foncé un peu verdâtre.

Tête et corselet comme dans le *Scheidleri*.

Élytres avec des stries formées par des points enfoncés, peu marqués, ayant en outre dans les intervalles qui ne sont pas élevés, comme dans le *Scheidleri*, quelques points enfoncés peu marqués, placés irrégulièrement, plus gros dans les quatrième, huitième et douzième, et paraissant former trois lignes peu distinctes.

Dessous du corps et pattes d'un noir assez brillant.

Il se trouve communément en Silésie et en Bohême.

B. D.

8. C. ROTHII, Kollar.

Pl. 36. fig. 3.

Oblongo-ovatus, supra viridi-æneus; elytris costis sub-elevatis interruptis.

Long. 11 lignes. Larg. 4 lignes.

De la forme et de la grandeur de l'*Excellens*, dont il n'est peut-être qu'une variété. Entièrement, en-dessus, d'un vert bronzé, un peu plus clair sur les bords des élytres.

Côtes interrompues des élytres moins élevées, moins distinctes et plus fortement ponctuées sur leurs bords.

Il se trouve en Transylvanie.

Décrit et figuré sur un individu mâle, qui m'a été envoyé par M. Kollar.

C. D.

T. I.

38

9. C. EXCELLENS.

Pl. 36. fig. 4.

Oblongo-ovatus, supra viridis, vel aeneus; thoracis elytrorumque margine aurato-purpureo; elytris costis elevatis interruptis.

DEJ. *Spec.* II. p. 46. n° 8.

FABR. *Syst. El.* I. p. 171. n° 12.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 170. n° 13.

FISCHER. *Entomographie de la Russie.* I. p. 25. n° 7.

T. 4. fig. 7. a. b.

C. *Goldeggii*. MEGERLE. DUFTSCHMID. II. p. 58. n° 51.

STURM. III. p. 81. n° 50. T. 61. fig. b. B.

FISCHER. *Entomographie de la Russie.* I. p. 114. n° 52.

T. 11. fig. 52. 53. 54. 55.

DEJ. *Cat.* p. 5.

Long. $10 \frac{1}{2}$, $11 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $5 \frac{3}{4}$, $4 \frac{1}{4}$ lignes.

Tantôt d'un beau vert doré, tantôt d'un vert bronzé obscur et quelquefois d'un bleu violet foncé; de la forme du *Monilis*, mais beaucoup plus petit.

Tête légèrement ponctuée, noire antérieurement.

Corselet plus large que la tête, moins long que large, presque carré, arrondi sur les côtés, légèrement échancré antérieurement et assez fortement postérieurement, ordinairement bordé de rouge-cuivreux ainsi que les élytres.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, ayant chacune treize ou quatorze côtes élevées,

inégalement interrompues, ou, si l'on veut, des lignes de points élevés, oblongs, de différentes grandeurs.

Dessous du corps et pattes d'un noir luisant.

Très-commun en Podolie et dans presque toute la Russie méridionale.

10. C. ERYTHROMERUS. Stéven.

Pl. 57. fig. 1.

Oblongo-ovatus, supra viridi-cyaneus; elytris costis elevatis alternatim interruptis; femoribus rufis.

DEJ. Spec. II. p. 48. n° 9.

Long. 11 lignes. Larg. 4 lignes.

Ressemble à l'*Excellens*, dont il n'est peut-être qu'une variété; d'un vert bleuâtre, avec les bords du corselet et des élytres presque bleus; un peu plus allongé; côtés du corselet un peu moins arrondis, avec les bords latéraux un peu plus relevés vers les angles postérieurs.

Élytres ayant chacune treize ou quatorze côtes élevées, dont les impaires sont presque entières.

Dessous du corps, jambes et tarses noirs, avec les cuisses d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve aux environs de Bender, dans la Russie méridionale.

11. C. ESTREICHERI. Besser.

Pl. 37. fig. 2.

Oblongo-ovatus, supra nigro-subæneus; elytris violaceo-

marginatis, costis elevatis interruptis, punctisque oblongis obsoletis elevatis triplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 48. n° 10.

FISCHER. *Entomographie de la Russie.* I. p. 112. n° 31.

T. II. fig. 31.

DEJ. *Cat.* p. 6.

Long. 9, $9\frac{1}{2}$ lignes. Larg. $3\frac{1}{2}$, $3\frac{3}{4}$ lignes.

Plus petit que l'*Excellens*, auquel il ressemble un peu par la forme; d'un noir légèrement bronzé.

Tête fortement ponctuée et ridée entre les yeux.

Corselet à peu près de la forme de celui de l'*Excellens*, mais plus fortement ponctué et plus ridé, avec ses bords un peu relevés, mais beaucoup moins que dans l'*Excellens*.

Élytres un peu plus larges à leur base que celles de l'*Excellens*, ayant une bordure violette assez large et plus ou moins marquée, couvertes de points élevés, un peu oblongs, rangés en lignes longitudinales, ceux des quatrième, huitième et douzième lignes ordinairement un peu plus gros et un peu plus relevés.

Dessous du corps et pattes noirs, avec les cuisses quelquefois d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve communément en Podolie.

12. C. SCABRIUSCULUS.

Pl. 37. fig. 3.

Oblongo-ovatus, niger; elytris punctis elevatis asperatis in strüs dispositis, punctisque impressis vel oblongis elevatis triplici serie.

- DEJ. *Spec.* II. p. 49. n° 11.
 OLIV. III. 35. p. 47. n° 50. T. 4. fig. 38. et T. 11. fig. 38. b.
 DUFTSCHMID. II. p. 29. n° 17.
 STURM. III. p. 100. n° 41.
 FISCHER. *Entomographie de la Russie*. II. p. 91. n° 20.
 T. 45. fig. 4. 5.
 DEJ. *Cat.* p. 6.
 C. *Agrestis*. CREUTZER. *Entomologische Versuche*. I.
 p. 110. n° 3. T. 2. fig. 15. a.
 SCH. *Syn. Ins.* I. p. 172. n° 30.
 VAR. A. C. *Erythropus*. ZIEGLER.
 FISCHER. *Entomographie de la Russie*. I. p. 118. n° 37.
 T. 11. fig. 37.
 PALLIARDI. *Beschreibung zweyer decaden neuer und
wenig bekannter Carabiden*. p. 19. T. 2. fig. 9.
 DEJ. *Cat.* p. 6.

Long. 8, 10 lignes. Larg. 3, 4 lignes.

De la taille de l'*Estreicherii* et d'une couleur noire un peu luisante.

Tête légèrement ponctuée.

Corselet à peu près le double plus large que la tête, moins long que large, presque carré, légèrement ponctué et ridé, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu relevés surtout vers les angles postérieurs, qui sont assez fortement prolongés en arrière et qui forment un angle assez aigu.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, et couvertes de points élevés, presque triangulaires, relevés de la pointe comme les aspérités d'une

râpe, disposés en lignes longitudinales, et ayant en outre trois rangées de points enfoncés peu marqués.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve en Autriche, mais plus communément en Hongrie, en Podolie et en Volhynie. La variété A ou *C. Erythropus* de Ziegler a les cuisses d'un rouge ferrugineux, et les trois rangées de points élevés un peu plus marqués.

15. C. LIPPII.

Pl. 37. fig. 4.

Oratus, niger; elytris punctis elevatis subasperatis confluentibus in striis dispositis, punctisque impressis vel oblongis elevatis obsoletis triplici serie.

DEJ. *Spec. II.* p. 51. n° 12.

DAHL. *Coleoptera und Lepidoptera.* p. 4.

Long. $8\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$ lignes. Larg. $3\frac{1}{2}$, 4 lignes.

Un peu plus large et un peu plus déprimé que le *Scabriusculus*, auquel il ressemble beaucoup.

Corselet plus large, avec les côtés plus arrondis, les bords moins relevés et les angles postérieurs un peu moins aigus.

Élytres plus larges, avec les points moins relevés, formant des aspérités moins prononcées, et se confondant souvent entre eux, ayant aussi les lignes de points enfoncés un peu moins distinctes.

Il se trouve en Hongrie, dans le Bannat.

14. C. MANNERHEIMII. Fischer.

Pl. 38. fig. 1.

Oblongus, niger; elytris rugosis, punctis elevatis in striis dispositis, punctisque oblongis obsoletis elevatis triplici serie.

DEJ. Spec. II. p. 52. n° 13.

C. Latrellii. FISCHER. Entomographie de la Russie. 1. p. 29. n° 10. T. 4. fig. 10. a. b.

C. Dejeanii. FISCHER. Idem. p. 209.

Long. 9, 10 lignes. Larg. $3\frac{1}{4}$, $3\frac{3}{4}$ lignes.

Ressemble un peu à l'*Estreicheiri*, mais entièrement noir et un peu plus allongé.

Corselet un peu plus large, un peu plus carré, avec les bords latéraux moins arrondis, et les angles postérieurs un peu plus prolongés et plus aigus.

Élytres un peu plus allongées, avec les points élevés formant les lignes longitudinales un peu moins distincts, un peu moins serrés, un peu moins arrondis, se terminant presque en pointe, comme dans le *Scabriusculus*.

Abdomen d'un noir un peu brun, le reste du corps et les pattes d'un noir assez brillant.

Il se trouve en Sibérie, près d'Irkutsk.

15. C. SAHLBERGI. Mannerheim.

Pl. 38. fig. 2.

Oblongo-ovatus, supra cupreo-æneus; thoracis elytro-

rumque margine subviridi-aureo; thorace subrugoso; elytris costis elevatis crenatis interruptis.

DEJ. Spec. II. Suppl. p. 484. n° 125.

Long. $9\frac{1}{2}$ lignes. Larg. $5\frac{1}{2}$ lignes.

Ressemble beaucoup à l'*Excellent*, mais plus petit, un peu plus allongé et un peu plus convexe; d'une couleur bronzée un peu cuivreuse, surtout sur les élytres, avec les bords latéraux d'un vert un peu doré.

Tête comme dans l'*Excellent*.

Corselet un peu plus étroit, un peu plus convexe, un peu plus fortement ponctué, moins arrondi sur les côtés, avec les angles postérieurs beaucoup moins prolongés en arrière.

Élytres un peu plus allongées et un peu plus convexes que celles de l'*Excellent*, ayant des côtes élevées interrompues à peu près comme celles de l'*Henningii*, mais un peu plus marquées et plus distinctes, avec des points enfoncés dans les intervalles, qui les font paraître crénelées.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve en Sibérie.

16. C. HENNINGII.

Pl. 58. fig. 3.

Oblongo-ovatus, supra aeneus; elytris costis elevatis crenatis interruptis; antennarum articulo primo femoribusque plerumque rufis.

DEJ. Spec. II. p. 52. n° 14.

FISCHER. *Memoires de la Société imp. des Naturalistes de Moscou*. v. p. 465. t. 14. fig. 8. 9.

FISCHER. *Entomographie de la Russie*. 1. p. 21. n° 5. t. 3. fig. 5. a. b.

PALLIARDI. *Beschreibung zweyer decaden neuer und wenig bekannter Carabiden*. p. 27. t. 3. fig. 12.

Long. 8, $8 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. 3, $3 \frac{1}{4}$ lignes.

Plus petit que l'*Estreicherii*, et d'un bronzé un peu cuivreux, avec les bords latéraux du corselet et des élytres d'un vert doré plus ou moins brillant.

Tête légèrement ponctuée et ridée irrégulièrement.

Antennes obscures, avec le premier article rougeâtre.

Corselet plus large que la tête, moins long que large, presque carré, un peu convexe, assez fortement ponctué et un peu ridé, un peu échancré antérieurement et un peu déprimé sur ses bords latéraux.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, assez convexes, couvertes de côtes élevées, assez serrées et très-fréquemment interrompues, ayant dans leurs intervalles des points enfoncés assez fortement marqués, qui font paraître ces côtes crénelées.

Dessous du corps, jambes et tarses noirs, avec les cuisses d'un rouge ferrugineux, quelquefois noires.

Il se trouve en Sibérie, aux environs de Barnaoul, près de l'Obi.

B. D.

17. C. LEACHII. Gebler.

Pl. 58. fig. 4.

Oblongo-ovatus, supra obscure cupreo-æneus; thoracis elytrorumque margine subviridi-aureo; thorace subquadrato, rugoso; elytris costis elevatis crenatis interruptis; antennarum articulis quatuor primis rufis.

FISCHER. *Entomographie de la Russie*. II. p. 75. n° 9. T. 29. fig. 6. et III. p. 169. n° 25.

Long. 7 lignes. Larg. $2\frac{3}{4}$ lignes.

Plus petit et un peu moins allongé que l'*Henningii*. D'un bronzé-cuivreux obscur en dessus, avec les côtés du corselet et des élytres plus brillans et presque dorés.

Les quatre premiers articles des antennes d'un rouge ferrugineux.

Corselet assez étroit, presque plane, presque carré et couvert de points enfoncés irréguliers assez gros, assez marqués et peu rapprochés les uns des autres.

Élytres un peu plus courtes, un peu plus ovales et plus convexes que celles de l'*Henningii*. Côtes élevées interrompues, à peu près comme dans cette espèce.

Dessous du corps et pattes d'un brun obscur un peu roussâtre.

Il se trouve en Sibérie.

G. D.

18. C. REGALIS. *Bæber.*

Pl. 39. fig. 1.

Oblongo-ovatus, subdepressus, supra æneus; elytris striis elevatis crenatis interruptis, punctisque obsoletis impressis triplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 54. n° 15.

VAR. A. *Thorace toto elytrorumque margine cyaneo.*

FISCHER. *Entomographie de la Russie.* I. p. 100. n° 21.

T. 9. fig. 21. 22.

C. *Cyanicollis.* STÉVEN.

VAR. B. *Thorace elytris que totis æneis.*

C. *Cuprinus.* BÆBER.

C. *Regalis.* STÉVEN.

Long. 10, 11 lignes. Larg. 4, 4 $\frac{1}{2}$ lignes.

Un peu plus large et plus déprimé que l'*Excellens*.

Tête d'un noir bronzé, avec quelques points enfoncés.

Corselet tantôt d'une couleur bronzée, tantôt d'un beau bleu violet, moins long que large et presque carré, assez fortement ponctué et un peu ridé, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux déprimés et un peu relevés.

Élytres d'une couleur bronzée, quelquefois un peu cuivreuse, quelquefois un peu verdâtre, avec la bordure tantôt de la même couleur, tantôt d'un beau violet, couvertes de stries assez serrées, dans lesquelles il y a des

points enfoncés; intervalles minces assez élevés et interrompus irrégulièrement.

Dessous du corps et pattes noirs.

Très-commun aux environs de Barnaoul, en Sibérie.

B. D.

19. C. HERRMANNI. *Mannerheim*.

Pl. 59. fig. 2.

Oblongo-ovatus, niger; elytris costis elevatis interruptis, punctisque obsoletissimis impressis triplici serie.

HUMMEL. *Essais entomologiques*. 6. p. 22. n° 2.

FISCHER. *Entomographie de la Russie*. III. p. 162. n° 14.

Long. $10 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $4 \frac{1}{4}$ lignes.

De la forme et de la grandeur de l'*Æruginosus*, dont il n'est peut-être qu'une variété. Presque entièrement noir en dessus, seulement les côtés du corselet et des élytres quelquefois très-légèrement verdâtres.

Corselet un peu plus étroit que celui de l'*Æruginosus*, et un peu rétréci postérieurement.

Les trois rangées de points enfoncés des élytres à peine distinctes.

Il se trouve près de Zlatoust, en Sibérie. C. D.

20. C. *ÆRUGINOSUS*. *Beber*.

Pl. 59. fig. 3.

Oblongo-ovatus, supra nigro subaneus; elytris costis elevatis interruptis, punctisque obsoletis impressis triplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 55. n° 16.

FISCHER. *Entomographie de la Russie*. I. p. 101. n^{os} 23 et 24. T. 9. fig. 23.

PALLIARDI. *Beschreibung zweyer decaden neuer und wenig bekannter Carabiden*. p. 25. T. 3. fig. 11.

VAR. A. *Elytris brunneis margine nigro-æneo*.

FISCHER? *Idem*. fig. 24.

C. Langsdorfi. STÉVEN.

Long. 10, 11 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 4, 4 $\frac{3}{4}$ lignes.

Un peu plus large et un peu plus convexe que l'*Excellent*, et entièrement en dessus d'un noir légèrement bronzé.

Corselet moins long que large, presque carré, un peu arrondi sur les côtés, un peu convexe, légèrement ponctué et ridé, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux déprimés et un peu relevés vers les angles postérieurs.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, avec les côtes élevées, interrompues à peu près comme dans l'*Excellent*, mais un peu moins marquées, et les intervalles quelquefois lisses et quelquefois ponctués.

Il se trouve en Sibérie, près des mines de Ridders.

Quelquefois les élytres sont brunâtres, avec le bord postérieur bronzé.

21. *C. ÆREUS*. Bæber.

Pl. 59. fig. 4.

Oblongo-ovatus, niger; thorace subcordato; elytris brunneis, nigro-æneo marginalis, costis elevatis punctisque impressis triplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 57. n° 17.

C. *Æruginosus?* var. FISCHER. *Entomographie de la Russie.* I. p. 101. n°s 23 et 24. T. 9. fig. 24.

Long. $10 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $4 \frac{1}{4}$ lignes.

Peut-être une variété de l'*Æruginosus*.

Corselet plus rétréci postérieurement, presque en cœur, un peu moins convexe, plus lisse, avec les points enfoncés à peine visibles.

Élytres d'un brun un peu roussâtre, avec le bord d'un noir bronzé, un peu moins convexes, avec les côtes élevées comme dans l'*Æruginosus*, mais continues, à l'exception des quatrième, huitième et douzième, qui ont chacune une ligne de points enfoncés, les intervalles des côtes assez fortement ponctués.

Il se trouve en Sibérie.

B. D.

22. C. ESCHSCHOLTZII. *Mannerheim.*

Pl. 40. fig. 1.

Ovatus, supra nigro-virescens; elytris costis elevatis interruptis, punctisque obsoletissimis impressis triplici serie.

HUMMEL. *Essais entomologiques.* 6. p. 21. n° 1.

FISCHER. *Entomographie de la Russie.* III. p. 165. n° 18.

Long. $10 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $4 \frac{1}{2}$ lignes.

A peu près de la grandeur de l'*Æruginosus*, mais proportionnellement un peu plus large et moins allongé.

D'un noir verdâtre en dessus, avec les côtés du corselet et des élytres un peu plus clairs et quelquefois d'un vert un peu bleuâtre.

Corselet un peu plus large que celui de l'*Æruginosus*, les angles postérieurs un peu plus relevés.

Élytres un peu plus larges, plus ovales et moins convexes. Côtes élevées plus marquées, interrompues, et composées de points allongés, quelquefois presque arrondis, bien distincts. Les points des quatrième, huitième et douzième côtes quelquefois un peu plus longs, plus distincts, et formant presque trois lignes de points oblongs élevés. Intervalles entre les points élevés ne paraissant pas ponctués.

Il se trouve en Sibérie.

25. C. PANZERI. Dejean.

Pl. 52. fig. 3.

Oblongo-ovatus, supra obscure cupreo-æneus; thoracis elytrorumque margine viridi-aureo; capite elongato-subcrassiore; thorace quadrato, subrugoso; elytris striis elevatis crenatis interruptis; antennarum articulis quatuor primis tibiaramque basi rufescentibus.

C. Regalis. var. GEBLER.

Long. $10 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $4 \frac{1}{4}$ lignes.

A peu près de la grandeur du *Regalis*.

D'un bronzé cuivreux obscur en dessus, avec les côtés du corselet et des élytres d'un vert doré brillant.

Tête noirâtre, grande, assez allongée, un peu renflée postérieurement, presque comme dans les espèces de la quatrième division. Les quatre premiers articles des an-

tennes d'un brun un peu roussâtre. Yeux assez petits et à peine saillans.

Corselet presque carré, légèrement rétréci près de la base, et couvert de points enfoncés assez marqués et souvent réunis.

Élytres moins ovales que celles du *Regalis*. Stries élevées, plus interrompues et plus fortement crénelées. Point de rangées de points enfoncés apparentes.

Base des jambes d'un brun roussâtre.

Il se trouve en Sibérie.

Décrit et figuré sur un individu mâle, qui m'a été envoyé par M. Gebler comme une variété du *Regalis*.

C. D.

24. C. BURNASCHEVII. Gebler.

Pl. 40. fig. 2.

Elongato-ovatus, niger; thorace nigro-æneo-virescente, rugoso, angustato, quadrato, postice subtruncato; elytris nigro-cupreis, viridi marginatis, antice angustatis, costis elevatis crenatis interruptis.

DEJ. Spec. II. p. 57. n° 18.

C. Hummellii. FISCHER. Entomographie de la Russie. II. p. 69. n° 5. T. 35. fig. 8.

Long. 10 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 4 lignes.

A peu près de la taille de l'*Excellens*.

Tête noire, assez fortement ponctuée, et ridée irrégulièrement.

Corselet d'un noir bronzé, proportionnellement beaucoup plus petit que dans les espèces voisines, moins long que large, presque carré, légèrement convexe, fortement ponctué, avec les bords latéraux presque pas relevés.

Élytres d'un noir bronzé un peu cuivreux, avec une bordure d'un vert un peu doré, assez convexes, en ovale allongé, plus étroites antérieurement que dans toutes les espèces voisines, couvertes de côtes élevées peu marquées, très-irrégulièrement interrompues; les intervalles assez fortement ponctués.

Dessous du corps et pattes d'un noir luisant.

Il se trouve en Sibérie.

25. C. MAURUS.

Pl. 40. fig. 3.

Ovatus, niger; thorace subrotundato; elytris subquadratis, punctis intricatis rotundatis elevatis, interjectis oblongis majoribus longitudinaliter dispositis.

DEJ. Spec. II. p. 59. n° 19.

FISCHER. Entomographie de la Russie. I. p. 24. n° 6.
T. 4. fig. 6. a. 6. b.

Calosoma Maurum. ADAMS. Mémoires de la Société imp. des Naturalistes de Moscou. v. p. 281. n° 5.

Long. $8 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $3 \frac{1}{2}$ lignes.

A peu près de la taille d'*Estreicheri*, mais plus raccourci; ce qui lui donne un peu le faciès d'un *Calosoma*.

Tête large, finement ponctuée, ridée irrégulièrement.

Corselet beaucoup moins long que large, et très-arrondi sur les côtés, un peu convexe, finement ponctué et ridé irrégulièrement, avec les bords latéraux assez fortement déprimés et relevés vers les angles postérieurs qui sont un peu prolongés et arrondis.

Élytres plus larges que le corselet, peu allongées, plus larges à la base que dans les espèces voisines, presque parallèles, arrondies vers l'extrémité, assez convexes, couvertes de points arrondis élevés, assez serrés et rangés en lignes longitudinales, parmi lesquels il y en a de plus gros, un peu allongés, et qui forment presque des lignes distinctes.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve sous les pierres dans les environs de Tiflis.

26. C. KRUBERI.

Pl. 40. fig. 4.

Ovatus, niger; thorace subquadrato; elytris ovatis, rugosis, punctisque elevatis obsoletis triplici serie.

DEJ. Spec. II. p. 60. n° 20.

FISCHER. Entomographie de la Russie. I. p. 28. n° 9.
T. 4. fig. 9. a. 9. b.

Long. $8 \frac{3}{4}$ lignes. Larg. $3 \frac{3}{4}$ lignes.

De la taille du précédent, mais d'une forme toute différente.

D'un noir assez brillant en dessus.

Tête légèrement ridée irrégulièrement.

Corselet moins long que large, presque carré, un peu convexe, finement ponctué et ridé, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu relevés surtout vers les angles postérieurs.

Élytres en ovale allongé, un peu plus étroites à la base que celles des espèces voisines, convexes, raboteuses, couvertes de petits tubercules élevés, terminés en pointes, comme dans le *Scabriusculus*, et rangés en lignes longitudinales.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve en Sibérie.

27. C. MAC LEAYI. Fischer.

Pl. 41. fig. 1.

Ovatus, supra nigro-cyaneus, thoracis elytrorumque margine aureo; elytris subrugosis, lineato-punctatis, punctis saepe confluentibus, punctisque oblongis elevatis obsoletis triplici serie.

DET. Spec. II. Suppl. p. 485. n° 126.

Long. 7 lignes. Larg. 3 lignes.

A peu près de la taille de l'*Arvensis*, mais plus court, d'une forme toute différente, et d'un noir bleuâtre, avec les bords latéraux d'une belle couleur dorée, verdâtre en dedans, cuivreuse en dehors.

Tête petite, assez fortement ponctué.

Corselet moins long que large, presque carré, arrondi sur les côtés, légèrement convexe, couvert de points

enfoncés assez marqués, mais peu rapprochés, avec les bords latéraux rebordés et peu relevés.

Élytres plus courtes que celles de l'*Arvensis*, assez larges, un peu rétrécies antérieurement, s'élargissant jusqu'aux deux tiers de leur longueur, couvertes de lignes élevées, plus ou moins interrompues et plus ou moins distinctes, dont trois paraissent former trois rangées peu distinctes de points oblongs élevés.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve en Daourie, dans la Sibérie orientale.

28. C. VIETINGHOVII.

Pl. 41. fig. 2.

Oblongo-ovatus, supra nigro-cyaneus; thoracis elytrorumque margine aureo; elytris profunde punctatis, lincis interruptis punctisque elevatis confluentibus.

DEJ. Spec. II. p. 61. n° 21.

ADAMS. Mémoires de la Soc. imp. des Natural. de Moscou.

III. p. 170. T. 12. fig. 3.

FISCHER. Entomographie de la Russie. I. p. 98. n° 19.
T. 9. fig. 19.

Long. $8 \frac{3}{4}$ lignes. Larg. $5 \frac{3}{4}$ lignes.

A peu près de la taille de l'*Estreicherii*. D'un noir bleuâtre, avec les bords latéraux du corselet et des élytres d'une belle couleur dorée, verdâtre en dedans et cuivreuse extérieurement.

Tête presque lisse.

Corselet plus large que la tête, moins long que large et presque carré, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu relevés.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé et assez convexes, ayant des points enfoncés, disposés en stries vers la base, mais se confondant vers l'extrémité, séparés par de petites lignes élevées, interrompues.

Dessous du corps et pattes noirs, avec les côtés du corselet d'un vert-doré.

Il se trouve en Sibérie, au bord de la Léna.

29. C. FAMILI.

Pl. 41. fig. 3.

*Ovatus, niger; thoracis elytrorumque margine cupreo-vio-
laceo; thorace rotundato; elytris ovatis, punctis elevatis
asperatis sparsis, majoribusque oblongis triplici serie.*

DEJ. Spec. II. p. 62. n° 22.

Long. 10 lignes. Larg. $4 \frac{1}{3}$ lignes.

A peu près de la taille d'*Alyssidotus*; mais proportionnellement plus large et plus convexe, et se rapprochant de la forme de l'*Hortensis*.

D'une couleur noire peu brillante, avec les bords latéraux d'un violet un peu cuivreux.

Tête légèrement ponctuée et ridée.

Corselet proportionnellement plus large que dans les espèces voisines, beaucoup moins long que large, très-

arrondi sur les côtés, couvert de petites rides irrégulières très-peu marquées, assez fortement échancré antérieurement, avec les bords latéraux larges, déprimés, assez relevés et les angles postérieurs très-arrondis.

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, assez convexes, couvertes de points élevés presque triangulaires, relevés de la pointe, ayant en outre trois rangées de points oblongs élevés, plus gros et plus distincts.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve en Sicile.

50. C. ALYSSIDOTUS.

Pl. 41. fig. 4.

Oblongo-ovatus, supra aeneus; thorace subrugoso; elytris cupreo marginatis, punctatis, punctis elevatis in striis dispositis, alternatim majoribus.

DEJ. *Spec.* II. p. 63. n° 25.

ILLIGER. *Käfer Preus.* I. p. 147.

SCH. *Syn. ins.* I. p. 169. n° 10.

FISCHER? *Entomographie de la Russie.* I. p. 99. n° 20.
T. 9. fig. 20.

Long. $9\frac{1}{2}$, 10 lignes. Larg. $4, 4\frac{1}{4}$ lignes.

Un peu plus petit que l'*Excellens*.

Tête d'un noir bronzé, avec quelques points enfoncés assez éloignés.

Corselet d'une couleur bronzée obscure, avec quelques reflets cuivreux vers la base, moins long que large, assez

plane, fortement ponctué et ridé, un peu chagriné, légèrement échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu déprimés et un peu relevés.

Élytres d'une couleur bronzée, quelquefois un peu cuivreuse, avec les bords latéraux d'un violet cuivreux, en ovale allongé, un peu plus large que le corselet, ayant des lignes de points élevés de différentes grandeurs; les quatrième, huitième et douzième, formées de points oblongs assez gros; les seconde, sixième et dixième, formées de points plus petits; les intervalles ponctués.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve en Italie, et quelquefois dans le midi de la France.

51. C. MOLLII. Sturm.

Pl. 42. fig. 1.

Oblongo-ovatus, supra nigro-brunneus vel obsкуро-æneus; thorace subrugoso; elytris rugosis, punctisque pluribus oblongis elevatis confusis triplici serie.

DEJ. Spec. II. p. 64. n° 24.

DAHL. Coleoptera und Lepidoptera. p. 4.

DEJ. Cat. p. 7.

VAR. A. DEJ. Cat. p. 7.

C. Carinthiacus. DAHL. Coleoptera und Lepidoptera. p. 5.

STURM. III. p. 68. n° 22. T. 58. fig. b. B.

Long. 8, 9 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 3 $\frac{1}{4}$, 4 lignes.

Plus petit que le *Catenulatus*, et d'un noir obscur quelquefois bronzé.

Tête assez petite, presque lisse.

Corselet moins long que large, presque carré, assez plane, assez fortement ponctué, quelquefois un peu chagriné, avec les bords latéraux légèrement rebordés, et les angles postérieurs assez prolongés en arrière.

Élytres un peu plus brunes que le corselet, quelquefois d'un bronzé obscur, un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, un peu sinuées près de l'extrémité, convexes, et couvertes de points et de petites lignes élevés, rangés presque sans ordre, parmi lesquels il y a trois lignes peu distinctes, formées de trois ou quatre points oblongs.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve dans la haute Carinthie.

52. C. Rossii. Bonelli.

Pl. 42, fig. 2.

Oblongus, niger; thoracis elytrorumque margine viridicyaneo; thorace subrugoso; elytris oblongis, punctato-striatis interstitiis interruptis.

DEJ. Spec. II. p. 66. n° 25.

DEJ. Cat. p. 6.

Long. 11, 12 lignes. Larg. $4\frac{1}{4}$, $4\frac{3}{4}$ lignes.

Plus allongé que le *Catenulatus*, auquel il ressemble beaucoup.

Presque entièrement noir en dessus, avec les bords latéraux d'un bleu un peu verdâtre.

Corselet moins long que large, presque carré, légèrement ponctué, presque chagriné, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux très-peu déprimés, assez fortement relevés.

Élytres un peu moins convexes et beaucoup plus allongées que celles du *Catenulatus*, couvertes de stries ponctuées, assez fortement marquées, dont les intervalles sont interrompus, et paraissent former une suite de points élevés oblongs, qui se terminent par une petite pointe.

Dessous du corps et pattes d'un noir plus brillant que le dessus.

Il se trouve en Italie.

TROISIÈME DIVISION.

33. C. CATENULATUS.

Pl. 42. fig. 3.

Oblongo-ovatus, supra nigro-cyaneus; thoracis elytrorumque margine violaceo; elytris ovatis, crenato-striatis, interstitiis subinterruptis, punctisque impressis vel oblongis elevatis triplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 68. n° 27.

FABR. *Syst. El.* I. p. 170. n° 9.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 169. n° 8.

GYLLENHAL. II. p. 57. n° 5.

DUFTSCHMID. II. p. 20. n° 4.

STURM. III. p. 61. n° 18.

DEJ. *Cat.* 6.