

www.e-rara.ch

Tome premier.

Cinquième division.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

allongé, avec les élytres plus lisses, se rapprochant un peu de l'*Hungaricus*, et d'une couleur noire, avec les bords latéraux d'un bleu un peu violet.

Tête un peu plus petite que celle des espèces précédentes.

Corselet moins long que large, un peu rétréci postérieurement, très-légèrement ponctué et ridé, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux déprimés et relevés.

Élytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, assez convexes, moins larges que celles du *Latus*, avec le dessin semblable, mais beaucoup moins marqué.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve en Espagne.

CINQUIÈME DIVISION.

58. *C. ALTERNANS.* Beaudet Lafarge.

Pl. 48. fig. 3.

Elongato-ovatus, supra æneus; thoracis elytrorumque margine cupreo; elytris elongatis, subparallelis, lineis tribus punctisque oblongis triplici serie elevatis, interstitiis punctulatis.

DEJ. Spec. II. p. 95. n° 49.

PALLIARDI. Beschreibung zweyer decaden neuer und wenig bekannter Carabiden. p. 21. T. 2. fig. 10.

C. Dejeanii. ULLRICH.

Long. 12, 13 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 4 $\frac{1}{2}$, 5 $\frac{1}{4}$ lignes.

Un peu plus allongé que le *Monilis*, et d'une couleur bronzée ordinairement un peu cuivreuse et quelquefois un peu verdâtre, avec les bords latéraux d'une couleur cuivreuse plus ou moins brillante.

Tête assez étroite allongée.

Corselet moins long que large, un peu en cœur, très-légèrement ponctué et ridé, très-légèrement échancré antérieurement, avec les bords latéraux rebordés et un peu relevés vers les angles postérieurs.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, presque parallèles, surtout dans le mâle, ayant chacune trois lignes élevées, assez marquées, et entre ces lignes une rangée de points oblongs également élevés; les intervalles assez larges, ayant chacun une ou deux rangées de petits points enfoncés plus ou moins marqués.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve en Corse, en Sardaigne, en Sicile et sur la côte de Barbarie.

59. C. CELTIBERICUS. Illiger.

Pl. 48. fig. 4.

Elongato-ovatus, supra obsкуро-æneus, thorace rugoso, subcordato; elytris oblongis, lineis duabus punctisque oblongis triplici serie elevatis, interstitiis rugosis.

DEJ. Spec. II. p. 97. n° 50.

DEJ. Cat. p. 6.

GERMAR? *Coleopt. Sp. Nov.* p. 5. n° 8.

C. Taganus. SCHNEIDER.

Long. 12, 13 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 4 $\frac{1}{2}$, 5 $\frac{1}{4}$ lignes.

Ressemble un peu au *Cancellatus*, mais plus grand, plus allongé et d'une couleur bronzée obscure, quelquefois un peu cuivreuse.

Tête un peu allongée et assez fortement ponctuée.

Corselet moins long que large et un peu en cœur, très-fortement ponctué et ridé, comme chagriné, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux légèrement rebordés, un peu relevés.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale très-allongé, ayant chacune trois lignes de points oblongs élevés, deux lignes entières également élevées entre celles de points oblongs, et la suture un peu relevée sans ligne entre elle et la première ligne de points élevés.

Il se trouve en Portugal.

60. *C. BARBARUS.*

Pl. 49. fig. 1.

Elongato-oratus, niger; thoracis elytrorumque margine subviolaceo; thorace subrugoso, quadrato; elytris oblongo-oratis, lineis duabus punctisque oblongis triplici serie elevatis, interstitiis rugosis.

DEJ. *Spec.* II. p. 98. n° 51.

Long. 13 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 5 $\frac{1}{2}$ lignes.

Ressemble beaucoup au *Celtibericus*, mais d'un noir obscur, avec les bords latéraux un peu bleuâtres.

Tête plus lisse que celle du *Celtibericus*, très-finement ponctuée.

Corselet plus petit et plus étroit antérieurement, moins ponctué, moins ridé, presque carré.

Élytres un peu plus larges et un peu plus convexes, avec le même dessin que le *Celtibericus*; mais les petits points élevés des intervalles un peu plus fortement marqués, plus distincts.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il a été trouvé par M. Bedeau, aux environs de Cadix; il se trouve aussi sur la côte de Barbarie.

61. *C. CANCELLATUS.*

Pl. 49. fig. 2.

Oblongo-ovatus, supra virescens vel æneus; antennarum articulo primo plerumque rufo; elytris subconvexis, apice subangustatis, lineis tribus (suturali subabbreviata) punctisque oblongis triplici serie elevatis, interstitiis subrugosis; femoribus interdum rufis.

DEJ. *Spec.* II. p. 99. n° 52.

ILLIGER. *Käfer Preus.* 1. 154. n° 18.

GYLLENHAL. II. p. 64. n° 11.

DUFTSCHMID. II. p. 32. n° 22.

DEJ. *Cat.* p. 6.

C. Granulatus. FABR. *Syst. El.* 1. p. 176. n° 36.

SCH. *Syn. Ins.* 1. p. 175. n° 43.

STURM. III. p. 42. n° 8.

VAR. *C. Merlachii.* DAHL.

- | | |
|----------------------------------|--|
| <i>C. Tuberculatus.</i> MEGERLE. | } DAH. <i>Coleoptera und Lepidoptera.</i> p. 3 et 4. |
| <i>C. Excisus.</i> MEGERLE. | |
| <i>C. Nigricornis.</i> ZIEGLER. | |
| <i>C. Soproniensis.</i> OESKAY. | |

Long. 8, 12 lignes. Larg. $3\frac{1}{4}$, 5 lignes.

D'une couleur bronzée, plus ou moins verdâtre, plus ou moins obscure, et quelquefois un peu cuivreuse.

Tête légèrement ponctuée et ridée.

Corselet moins long que large, un peu en cœur, très-finement ponctué et ridé, très-légèrement chagriné, un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu déprimés et légèrement rebordés.

Élytres en ovale un peu allongé, plus ou moins convexes, un peu déprimées et allongées vers l'extrémité, avec le bord extérieur sinué à l'extrémité, près de la suture, ayant chacune trois lignes élevées et lisses, dont celle qui est près de la suture ne va pas jusqu'à l'extrémité; entre ces lignes est une rangée de gros points oblongs élevés; les intervalles assez grands, très-légèrement chagrinés.

Dessous du corps et pattes noirs, avec les cuisses souvent d'un rouge ferrugineux.

Il varie beaucoup et il est très-commun dans toute l'Allemagne, dans les champs, au bord des chemins et près des habitations, sous les pierres. On le trouve aussi en Suède, en Russie, en Pologne et en Suisse; il est beaucoup moins commun en France.

Le *C. Excisus* de MM. Megerle et Dahl est un peu plus grand; les élytres sont un peu plus allongées et moins

convexes, et les cuisses sont toujours rouges. Il se trouve aux environs de Vienne.

Le *C. Tuberculatus* des mêmes auteurs a le corselet un peu plus fortement ponctué; les élytres sont plus convexes, moins allongées, et les lignes et les points des élytres sont plus marqués; les cuisses sont rouges. Il se trouve ordinairement dans le nord de l'Allemagne.

Le *C. Merlachii* que M. Dahl a pris en Hongrie dans les monts Crapacks ne paraît pas différer du *Tuberculatus*.

Le *C. Nigricornis* de M. Ziegler a toujours le premier article des antennes noir; il est aussi un peu plus grand et un peu plus allongé; il est commun en Styrie. M. Dejean a trouvé aussi quelques individus à premier article des antennes noir, dans la Croatie et dans l'île de Pago en Dalmatie.

Le *C. Soproniensis* de M. Oeskay, qui se trouve dans les environs de OEdenbourg en Hongrie, ne diffère pas du *Nigricornis*.

Toutes ces variétés ne sont pas constantes; et, quand on compare ensemble un grand nombre d'individus de différens pays, on trouve tous les passages de l'un à l'autre, il devient impossible d'en faire des espèces particulières et de les séparer.

62. C. EMARGINATUS.

Pl. 49. fig. 3.

Elongato-ovatus, supra virescens vel cupreo-æneus; thorace subelongato, angulis posticis productis; elytris oblongis, apice subangustatis, lineis tribus (suturali subabbreviata)

T. 1.

45

punctisque oblongis triplici serie parum elevatis, interstitiis subpunctatis.

DEJ. Spec. II. p. 102. n° 53.

DUFTSCHMID. II. p. 31. n° 20.

STURM. III. p. 47. n° 11. T. 57. fig. a. B. C.

DEJ. Cat. p. 6.

Long. 12, 13 lignes. Larg. $4 \frac{1}{5}$, 5 lignes.

Plus grand, plus allongé et un peu plus convexe que le *Cancellatus*, auquel il ressemble beaucoup; mais d'une couleur ordinairement un peu plus cuivreuse, avec les bords latéraux un peu verdâtres.

Corselet un peu plus étroit et plus allongé, avec les bords latéraux plus relevés, surtout vers les angles postérieurs, qui sont beaucoup plus prolongés en arrière.

Élytres plus allongées, moins convexes, avec le bord extérieur plus fortement sinué vers l'extrémité dans la femelle, les lignes et les points des élytres un peu moins élevés, et les intervalles très-légèrement ponctués.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve dans la Carniole, l'Illyrie et les provinces voisines.

65. C. GRANIGER.

Pl. 49. fig. 4.

Oblongo-ovatus, supra-æneus; thorace punctatissimo, subrugoso; elytris subconvexis, apice subrotundatis, lineis tribus (suturali subabbreviata) punctisque oblongis triplici serie elevatis prominentibus, interstitiis rugosis.

DEJ. *Spec.* II. p. 103. n° 54.

DAHL. *Coleoptera und Lepidoptera.* p. 3.

PALLIARDI. *Beschreibung zweyer decaden neuer und wenig bekannter Carabiden.* p. 11. T. 1. fig. 5.

Long. 12, 12 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 4 $\frac{3}{4}$ 5 lignes.

Ressemble beaucoup au *Cancellatus*, dont il n'est peut-être qu'une variété; mais il a surtout beaucoup de rapports avec le *Tuberculatus* de Megerle.

Un peu plus grand et d'un bronzé un peu cuivreux sur la tête et le corselet.

Corselet plus fortement ponctué, plus ridé et comme chagriné.

Élytres un peu plus larges, un peu plus arrondies vers l'extrémité, avec les lignes de points élevés, beaucoup plus fortement et plus distinctement marquées, et les intervalles un peu plus chagrinés.

Il se trouve dans le Bannat, en Hongrie.

64. C. INTERMEDIUS.

Pl. 50. fig. 1.

Oblongo-ovatus, supra æneus; elytris oblongis, subparallelis, apice subrotundatis, lineis tribus (suturali abbreviata) punctisque oblongis triplici serie elevatis, interstitiis subrugosis.

DEJ. *Spec.* II. p. 104. n° 55.

DEJ. *Cat.* p. 6.

Long. $9 \frac{1}{2}$, 11 lignes. Larg. $3 \frac{3}{4}$, $4 \frac{1}{2}$ lignes.

Ressemble beaucoup au *Cancellatus*, dont il n'est peut-être qu'une variété, mais paraissant intermédiaire entre cette espèce et le *Morbillosus*.

Diffère du *Cancellatus*, par les antennes et les pattes, qui sont toujours noires, par les élytres, un peu moins ovales, plus parallèles, plus arrondies postérieurement, et par la ligne élevée près de la suture, qui est plus courte, et ne va guère que jusqu'à la moitié des élytres.

Diffère du *Morbillosus*, par sa forme moins large, par le bord postérieur des élytres, qui est sinué comme dans le *Cancellatus*, par les lignes, les points élevés et leurs intervalles, qui sont à peu près comme dans ce dernier.

Il a été découvert par M. Dejean, sous les pierres en Dalmatie, près de Vergoraz.

65. C. MORBILLOSUS.

Pl. 50. fig. 2.

Ovatus, supra æneus, interdum virescens; elytris ovatis, apice subrotundatis, lineis tribus integris punctisque oblongis triplici serie elevatis, interstitiis elevato-punctatis.

DEJ. *Spec.* II. p. 104. n° 56.

PANZER. *Fauna Germ.* 81. 5.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 175. n° 41.

GYLLENHAL. II. p. 65. n° 12.

DUFTSCHMID. II. p. 30. n° 19.

STURM. III. p. 39. n° 7.

DEJ. Cat. p. 6.

Long. $10 \frac{1}{2}$, $12 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $4 \frac{1}{4}$, $5 \frac{1}{4}$ lignes.

VAR. A. *C. Ulrichii*. ZIEGLER.

GERMAB. *Coleopt. Sp. Nov.* p. 5. n° 9.

DEJ. Cat. p. 6.

Long. $11 \frac{1}{2}$, 13 lignes. Larg. 5, $5 \frac{1}{4}$ lignes.

VAR. B. *C. Fastuosus*. DAHL. *Coleoptera und Lepidoptera*. p. 5.

PALLIARDI. *Beschreibung zweyer decaden neuer und wenig bekannter Carabiden*. p. 13. t. 2. fig. 6.

Long. $11 \frac{1}{2}$, 13 lignes. Larg. 5, $5 \frac{3}{4}$ lignes.

Un peu plus grand et plus large que le *Cancellatus*, auquel il ressemble beaucoup à la première vue, et d'un bronzé un peu cuivreux.

Tête plus grosse et plus large.

Corselet plus court, plus large, plus carré et un peu plus arrondi sur les côtés, avec les bords latéraux un peu plus déprimés, surtout vers la base.

Élytres plus larges, plus arrondies postérieurement, avec le bord postérieur nullement sinué dans aucun sexe, les lignes et les points élevés plus lisses, plus fortement et plus distinctement marqués, la ligne près de la suture entière et allant jusqu'à l'extrémité, et les intervalles coupés par de petites lignes transversales paraissant former une suite de petits points élevés.

Il se trouve assez communément dans toute l'Allemagne.

Le *C. Ulrichii* de Ziegler, ou variété A, diffère de celui-ci par sa forme un peu plus large, par les points et les lignes des élytres encore plus fortement marqués, par les angles postérieurs du corselet, qui sont moins relevés, moins prolongés en arrière et plus arrondis, et par la couleur, qui est ordinairement un peu plus cuivreuse et plus obscure. Mais ces différences ne sont pas constantes, et l'on trouve des variétés intermédiaires qui forment le passage de l'un à l'autre.

Il se trouve ordinairement en Autriche et en Silésie.

La variété B, *C. Fastuosus* de Dahl, ne diffère de la variété A que par la couleur, qui est verte ou d'un bleu violet, et par le corselet, qui est comme dans le *Morbillosus* ordinaire.

M. Dahl l'a trouvé en Hongrie, dans le Bannat.

B. D.

66. C. PALUSTRIS. Eschscholtz.

Pl. 50. fig. 3.

Oblongus, supra cupreo-æneus; thorace quadrato, angulis posticis non productis; elytris oblongis, lineis duabus punctisque oblongis triplici serie elevatis, interstitiis rugosis.

Long. $8 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $3 \frac{1}{2}$ lignes.

Voisin du *Mæander*, mais plus grand, proportionnellement un peu plus allongé, et d'une couleur un peu plus brillante en dessus.

Corselet plus carré, un peu plus arrondi sur les côtés et non rétréci postérieurement.

Élytres un peu plus allongées; les deux lignes élevées moins saillantes et non sinuées; les points des trois rangées moins gros et moins saillans.

Décrit et figuré sur un individu femelle, qui m'a été envoyé par M. Eschscholtz, comme venant du Kamtschatka.

67. C. TUBERCULOSUS. Gebler.

Pl. 50. fig. 4.

Oblongo-ovatus, supra cupreo-æneus; thorace quadrato, angulis posticis non productis; elytris oblongo-ovatis, lineis tribus granulatis obsoletis punctisque oblongis prominentibus triplici serie elevatis, interstitiis rugosis.

C. Tuberculatus. FISCHER. *Entomographie de la Russie.* III. p. 186. n° 43. T. 7. c. fig. 1.

Long. $7\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 3 lignes.

De la grandeur et de la couleur du *Mæander*, dont il est très-voisin, mais un peu moins allongé.

Corselet un peu plus brillant, plus arrondi sur les côtés, moins large antérieurement; ce qui le fait paraître non rétréci postérieurement.

Élytres un peu plus larges; les trois lignes élevées très-peu marquées, surtout la première, et composées de points presque arrondis, placés à côté les uns des autres; les points des trois rangées à peu près comme dans le *Mæander*, mais cependant un peu moins gros et moins saillans.

Il se trouve en Sibérie.

C. D.

68. C. MÆANDER.

Pl. 51. fig. 4.

Oblongus, supra cupreo-æneus; thorace quadrato, angulis posticis non productis; elytris oblongis, lineis duabus subsinuatis punctisque oblongis prominentibus triplici serie elevatis, interstitiis rugosis.

FISCHER. *Entomographie de la Russie*. I. p. 103. n° 26.
T. 10. fig. 26.

DEJ. *Spec. II. Suppl.* p. 486. n° 127.

Long. $7 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $2 \frac{3}{4}$ lignes.

D'un bronzé un peu cuivreux; plus petit que le *Granulatus*, auquel il ressemble un peu.

Tête moins ridée, plus distinctement ponctuée.

Corselet très-légèrement rétréci postérieurement, un peu plus convexe, plus fortement ponctué.

Élytres un peu moins allongées que celles du *Granulatus*, plus convexes, un peu plus arrondies à l'extrémité, avec le bord extérieur d'une couleur cuivreuse un peu plus brillante; les points qui forment les trois rangées plus gros, plus saillans, moins allongés, très-lisses et presque noirs; la suture plus saillante, très-lisse et presque noire; les deux lignes élevées légèrement ondulées ou sinuées, et les intervalles presque rugueux.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve en Sibérie, près de Nertschinsk.

69. C. GRANULATUS.

Pl. 51. fig. 2.

Oblongus, subdepressus, supra obscuro-æneus; thorace quadrato, angulis posticis non productis; elytris elongato-oblongis, lineis tribus punctisque oblongis triplici serie elevatis, interstitiis subrugosis.

DEJ. *Spec.* II. p. 106. n° 57.

LINNÉ. *Syst. Nat.* II. p. 668. n° 2.

GYLLENHAL. II. p. 62. n° 10.

DUFTSCHMID. II. p. 34. n° 24.

DEJ. *Cat.* p. 6.

C. Cancellatus. FABR. *Syst. El.* I. p. 176. n° 37.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 175. n° 44.

STURM. III. p. 49. n° 12.

VAR. A. *C. Interstitialis.* DUFTSCHMID. II. p. 35. n° 25.

STURM. III. p. 51. n° 13. T. 57. fig. d. D.

DEJ. *Cat.* p. 6.

Long. 8, 10 lignes. Larg. 3, 4 lignes.

Ordinairement un peu plus petit, plus étroit, plus allongé et moins convexe que le *Cancellatus*, auquel il ressemble un peu.

Tête légèrement ponctuée.

Corselet moins long que large, assez plane, presque carré, légèrement ponctué et ridé, avec les bords latéraux un peu déprimés, légèrement rebordés et un peu relevés vers les angles postérieurs.

Élytres un peu plus larges que le corselet, allongées, un peu déprimées, avec le bord extérieur un peu sinué vers l'extrémité, mais ne formant pas de dent comme dans le *Cancellatus*, ayant chacune trois lignes élevées, entre ces lignes une rangée de points élevés, et en outre une quatrième rangée de petits points oblongs élevés près du bord extérieur, les intervalles légèrement chagrinés.

Dessous du corps et pattes noirs, avec les cuisses quelquefois d'un rouge ferrugineux.

Il est très-commun en Allemagne, dans les bois, sous les pierres et les mousses; on le trouve aussi en Suède, en Pologne, en Russie, en Sibérie, et dans les parties orientales et septentrionales de la France; il est très-rare aux environs de Paris.

Le *C. Interstitialis* de Duftschmid n'est qu'une très-légère variété de cette espèce, dans laquelle les lignes et les points élevés sont un peu moins marqués; les lignes que l'on aperçoit quelquefois entre les lignes et les points élevés le sont au contraire davantage, et les intervalles sont un peu plus chagrinés. Il est aussi un peu plus petit et d'une couleur plus foncée; il se trouve dans les montagnes de la Carinthie. B. D.

70. *C. MENETRIESII. Faldermann.*

Pl. 51. fig. 3.

Oblongus, supra obscuro-æneus; thorace subquadrato, angulis posticis parum productis; elytris oblongis, lineis duabus punctisque oblongis triplici serie elevatis prominentibus, interstitiis subrugosis.

FISCHER. *Entomographie de la Russie*. III. p. 185. n° 42.
T. 7. b. fig. 2.

Long. $8 \frac{3}{4}$ lignes. Larg. $5 \frac{1}{2}$ lignes.

A peu près de la grandeur, de la forme et de la couleur du *Granulatus*, mais un peu plus convexe.

Corselet un peu moins carré, moins plane, légèrement arrondi sur les côtés, plus lisse antérieurement, un peu plus fortement ponctué postérieurement; angles postérieurs un peu plus prolongés en arrière et plus arrondis.

Élytres un peu moins allongées, plus convexes; la ligne élevée près de la suture presque entièrement effacée; les deux autres et les trois rangées de points élevés plus saillantes; les intervalles entre les points élevés un peu enfoncés et un peu plus brillans que le reste des élytres.

Je l'ai reçu de M. Faldermann, comme pris aux environs de Saint-Petersbourg. M. Fischer dit qu'on le trouve aussi en Sibérie.

C. D.

SIXIÈME DIVISION.

71. C. CLATHRATUS.

Pl. 51. fig. 4.

Oblongo-ovatus, supra nigro-aneus; thorace quadrato, angulis posticis non productis; elytris lineis tribus elevatis, interjectis foveis aureis triplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 108. n° 58.

FABR. *Syst. El.* I. p. 176. n° 38.

OLIV. III. 35. p. 35. n° 33. T. 5. fig. 59 et T. 11. fig. 59. b.