

www.e-rara.ch

Tome premier.

Onzième division.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

ONZIÈME DIVISION.

100. C. CRIBRATUS. *Bæber.*

Pl. 59. fig. 3.

Ovatus; niger; elytris subrugosis, foveisque excavatis triplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 139. n° 83.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 171. n° 18.

GERMAR. *Fauna Ins. Europ.* VI. T. 3.

DEJ. *Cat.* p. 6.

FISCHER. *Entomographie de la Russie.* I. p. 92. n° 15.

C. Cribellatus. FISCHER. *Idem.* T. 8. fig. 13.

C. Foveolatus. ADAMS. *Mémoires de la Société imp. des Naturalistes de Moscou.* V. T. 16. fig. A. 1. A. 2.

Long. $11 \frac{1}{2}$, 12 lignes. Larg. $4 \frac{3}{4}$, 5 lignes.

A peu près de la taille de l'*Hortensis*, et entièrement d'une couleur noire un peu luisante.

Tête peu avancée, finement ponctuée.

Corselet moins long que large, presque carré, un peu rétréci postérieurement, très-finement ponctué et ridé, assez échancré antérieurement, avec les bords latéraux déprimés et un peu relevés vers les angles postérieurs.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, assez convexes, très-légèrement chagrinées, ayant chacune trois rangées de très-gros points enfoncés

arrondis, et en outre un quatrième rang de points plus petits, irréguliers, vers le bord.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve dans les montagnes du Caucase.

101. C. PERFORATUS.

Pl. 59. fig. 4.

Ovatus, niger; thorace quadrato; elytris punctatis, punctisque majoribus impressis, plus minusve in serie dispositis.

DEJ. *Spec.* II. p. 140. n° 84.

FISCHER. *Entomographie de la Russie.* I. p. 95. n° 11.

C. *Cribratus*. FISCHER. *Idem.* T. 8. fig. 15.

C. *Thoracicus*. GEBLER. *GERMAN. Coleopt. Sp. Nov.* p. 8. n° 12.

Long. $10 \frac{1}{2}$, $11 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $4 \frac{1}{4}$, $4 \frac{3}{4}$ lignes.

Un peu plus petit que le *Cribratus*, et d'un noir assez luisant, avec la tête et le corselet proportionnellement beaucoup plus grand et les élytres plus courtes.

Tête grosse, large, assez plane, très-finement ponctuée.

Corselet moins long que large, presque carré, un peu arrondi sur les côtés, un peu convexe, très-finement ponctué, assez échancré antérieurement, avec les bords latéraux légèrement rebordés et un peu relevés vers les angles postérieurs.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, très-convexes, irrégulièrement ponctuées, et ayant

en outre cinq ou six rangées de points enfoncés plus gros, assez marqués, plus ou moins nombreux; quelques-unes de ces rangées manquent souvent entièrement.

Pattes noires assez grosses et assez courtes.

Il se trouve en Sibérie et dans le Caucase.

102. C. MINGENS. Stéven.

Pl. 60. fig. 1.

Oblongo-ovatus, niger; thorace quadrato; elytris oblongis, subtilissime punctatis, punctisque obsoletis impressis triplici serie.

DEJ. Spec. II. p. 142. n° 85.

SCH. Syn. Ins. 1. p. 173. n° 32. T. 3. fig. 2.

DEJ. Cat. p. 6.

FISCHER? *Entomographie de la Russie*. II. p. 81. n° 13.

T. 29. fig. 4.

C. Mæotis. STÉVEN. FISCHER? *Idem*. p. 86. n° 16.

T. 34. n° 1.

VAR. A. C. *Hungaricus*. DAHL.

Long. $11 \frac{1}{2}$, 13 lignes. Larg. $4 \frac{1}{2}$, $5 \frac{1}{4}$ lignes.

Ressemble beaucoup à l'*Hungarius*, mais plus grand, plus allongé, et entièrement d'un noir assez luisant.

Tête grosse, large, assez plane, très-finement ponctuée et ridée.

Corselet moins long que large, presque carré, un peu arrondi sur les côtés, un peu convexe, très-finement ponctué et ridé, assez échancré antérieurement, avec

les bords latéraux un peu déprimés, très-légèrement rebordés et relevés vers les angles postérieurs.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, assez convexes, couvertes de petits points enfoncés placés irrégulièrement, qui se confondent souvent entre eux, et ayant en outre trois rangées de points enfoncés peu marqués.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve dans la Russie méridionale et dans le Banat, en Hongrie.

103. C. VOMAX. Schænherr.

Pl. 60. fig. 2.

Oblongo-ovatus, niger; thorace quadrato; elytris oblongis, subrugosis, punctisque obsoletis impressis triplici serie.

DEJ. Spec. II. p. 143. n° 86.

C. *Gastridulus*? FISCHER. Entomographie de la Russie. II. p. 83. n° 14. T. 29. n° 25.

Long. 11, 11 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 4 $\frac{1}{4}$, 4 $\frac{1}{2}$ lignes.

Ressemble beaucoup au *Mingens*, dont il n'est peut-être qu'une variété; un peu plus petit, moins allongé, les élytres un peu plus fortement ponctuées et paraissant presque chagrinées.

Il se trouve dans la Russie méridionale.

104. C. HUNGARICUS.

Pl. 60. fig. 3.

Ovatus, niger; thorace quadrato; elytris ovatis, subtilissime punctatis, punctisque obsoletis impressis triplici serie.

DEJ. *Spec.* II. p. 144. n° 87.

FABR. *Syst. El.* I. p. 174. n° 26.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 173. n° 31.

AHRENS. *Fauna Ins. Europ.* IV. T. 1.

DEJ. *Cat.* p. 6.

Long. 10, 12 lignes. Larg. 4, 5 lignes.

De la taille de l'*Hortensis*, et entièrement noir en dessus.

Tête moins grosse que celle du *Mingens*, très-légèrement ponctuée et ridée.

Corselet moins long que large, presque carré, un peu arrondi sur les côtés, un peu plus plane et un peu plus lisse que celui du *Mingens*, très-finement ponctué et ridé, assez échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu déprimés, très-légèrement rebordés, et moins relevés que dans le *Mingens* vers les angles postérieurs.

Élytres un peu plus larges que le corselet; en ovale allongé, plus courtes, plus convexes et plus arrondies postérieurement que celles du *Mingens*, un peu moins fortement ponctuées, et ayant, comme cette espèce, trois rangées de points enfoncés peu marqués.

Dessous du corps et pattes noirs.

Il se trouve en Hongrie.

105. C. GRÆCUS.

Pl. 60. fig. 4.

Ovatus, niger; thorace quadrato, postice subtruncato; elytris ovatis, convexis, sublævigatis, punctisque obsoletis impressis triplici serie.

DEJ. Spec. II. p. 145. n° 88.

Long. 11 lignes. Larg. $4\frac{1}{2}$ lignes.

Ressemble beaucoup à l'*Hungaricus*, mais plus lisse.

Corselet beaucoup plus petit, un peu plus arrondi sur les côtés, un peu moins échancré antérieurement, avec les angles postérieurs plus arrondis, moins prolongés en arrière, la base presque tronquée et à peine échancrée.

Élytres un peu plus courtes, plus convexes, moins arrondies postérieurement, couvertes de très-petits points enfoncés, moins marqués et plus éloignés les uns des autres que dans l'*Hungaricus*, ce qui les fait paraître plus lisses.

Il se trouve en Grèce.