

www.e-rara.ch

Tome second.

XIII. Omophron.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

XIII. OMOPHRON. Latreille.

SCOLYTUS. Fabricius.

Le premier article des tarses antérieurs légèrement dilaté dans les mâles, en forme de carré allongé. Dernier article des palpes allongé, presque ovalaire et tronqué à l'extrémité. Antennes filiformes. Lèvre supérieure entière ou très-légèrement échancrée. Mandibules un peu avancées, non dentées intérieurement. Une dent bifide au milieu de l'échancrure du menton. Corps court et presque orbiculaire. Corselet court et s'élargissant postérieurement. Élytres courtes en demi-ovale.

Ce genre avait d'abord été établi par Fabricius sous le nom de *Scolytus*, déjà employé par Geoffroy pour désigner des insectes de la famille des *Xylophages*. Latreille en conservant ce genre lui donna le nom d'*Omophon*, qui fut généralement adopté.

Les *Omophon* sont des insectes de forme arrondie, ordinairement variés de jaune pâle et de vert métallique, qui présentent tous les caractères suivans :

La tête est assez large, presque transversale, et comme emboîtée dans le corselet. La lèvre supérieure est assez étroite, un peu avancée, entière ou très-légèrement échancrée. Les mandibules sont plus ou moins avancées, plus ou moins arquées, assez aiguës et non dentées intérieurement. Le menton a une dent bifide au milieu de son échancrure. Le dernier article des palpes est assez

allongé et presque ovalaire. Les antennes sont filiformes et à peu près de la longueur de la moitié du corps. Les yeux sont assez grands et très-peu saillans. Le corselet est assez court et s'élargit postérieurement. Les élytres sont courtes, assez convexes et presque en demi-ovale. Les pattes sont assez longues. L'échancrure qui termine les jambes antérieures en dessous est très-légèrement oblique, et s'aperçoit un peu sur le côté interne. Le premier article des tarses est légèrement dilaté dans les mâles en forme de carré allongé.

Les *Omophron* se trouvent aux bords des rivières et des ruisseaux; ils s'enfoncent ordinairement assez profondément dans le sable, mais on les fait sortir facilement en jetant de l'eau sur le terrain qu'ils occupent.

1. O. LIMBATUM.

Pl. 85. fig. 2.

Testaceo-ferrugineum; capite postico, thoracis macula, elytrorum sutura fasciisque tribus undatis viridi-æneis.

DEJ. *Spec.* II. p. 258. n° 1.

OLIV. *Encycl.* VIII. p. 486. n° 2.

DEJ. *Cat.* p. 18.

Scolytus Limbatus. FABR. *Syst. El.* I. p. 247. n° 2.

SCH. *Syn. Ins.* I. p. 249. n° 2.

DUFTSCHMID. I. p. 294. n° 1.

Carabus Limbatus. OLIV. III. 35. p. 89. n° 122. T. 4.
fig. 43. a. b.

T. II.

Long. $2 \frac{1}{4}$, 5 lignes. Larg. $1 \frac{1}{2}$, 2 lignes.

D'une forme presque ronde, assez convexe et d'un jaune-errugineux un peu plus clair sur les côtés.

Tête large, peu avancée, marquée postérieurement d'une grande tache d'un vert bronzé, fortement échan-crée au milieu et profondément ponctuée; antennes d'un jaune assez pâle.

Corselet plus large que la tête, moitié moins long que large, un peu convexe, s'élargissant postérieurement, marqué d'une grande tache d'un vert bronzé, fortement ponctué.

Élytres larges, courtes, arrondies postérieurement, assez convexes; les stries bien marquées et fortement ponctuées; les intervalles lisses; la suture d'un beau vert bronzé, et trois bandes transversales de la même couleur, inégales, sinuées irrégulièrement et n'atteignant pas tout-à-fait les bords.

Dessous du corps et pattes jaunes.

Souvent les bandes transverses sont très-étroites et interrompues en plusieurs endroits; d'autres fois elles sont très-larges, et quelquefois elles se réunissent et occupent presque entièrement tout le milieu des élytres.

Il se trouve dans le midi de l'Allemagne, en Italie, en Espagne et dans presque toute la France; mais il est plus commun dans le midi que dans le nord. Il n'est pas rare aux environs de Paris, sur les bords de la Seine.

2. O. VARIEGATUM.

Pl. 85. fig. 5.

Pallido-testaceum; capite postico, thoracis maculis tribus, elytrorum sutura fasciisque tribus undatis interruptis, viridi-æneis.

DEJ. *Spec.* II. p. 259. n° 2.

OLIV. *Encycl.* VIII. p. 486. n° 5.

DEJ. *Cat.* p. 18.

Long. $5 \frac{3}{4}$ lignes. Larg. $2 \frac{1}{4}$ lignes.

Un peu plus grand que le *Limbatus*, un peu moins arrondi et d'un jaune beaucoup plus pâle.

Tête proportionnellement un peu moins large; la tache de la partie postérieure beaucoup moins large, entièrement séparée dans son milieu et échancrée sur les côtés.

Corselet proportionnellement plus étroit, un peu plus long, s'élargissant un peu moins postérieurement, paraissant presque ridé, marqué d'une petite ligne longitudinale d'un vert bronzé dans son milieu, et d'une autre petite ligne de la même couleur, un peu oblique sur chaque côté.

Élytres un peu moins convexes; les stries un peu plus marquées, moins fortement ponctuées; la suture beaucoup plus étroite; les trois bandes transversales aussi beaucoup plus étroites, souvent interrompues, paraissant formées de petites lignes longitudinales placées à côté les unes des autres.