

www.e-rara.ch

Tome second.

IV. Pogonus.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelnformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

rieurement. Les deux premiers articles des tarsi antérieurs sont légèrement dilatés dans les mâles, triangulaires, coupés un peu obliquement à l'extrémité et plus saillans en dedans qu'en dehors; les deux suivans sont plus petits, même dans les femelles, égaux, assez courts et cordiformes. Les articles des tarsi intermédiaires et postérieurs sont allongés, très-légèrement triangulaires et presque cylindriques. Les crochets des tarsi ne sont pas dentelés en dessous.

M. FLAVIPES.

Pl. 102. fig. 5.

Nigro-piceus; thorace subtransverso; elytris striatis, punctoque impresso; antennis pedibusque flavo-testaceis.

DEJ. Spec. v. Suppl. p. 700. n° 1.

Il se trouve aux environs de Buenos-Ayres, où il a été découvert par M. Lacordaire.

IV. POGONUS. Ziegler.

RAPTOR. Megerle. PLATYSMA. Sturm. CARABUS. Duftschmid.

Les deux premiers articles des tarsi antérieurs dilatés dans les mâles. Dernier article des palpes allongé, légèrement ovalaire et terminé presque en pointe. Antennes assez courtes, presque filiformes, légèrement comprimées et grossissant un peu vers l'extrémité. Lèvre supérieure

courte, transversale et coupée presque carrément. Mandibules peu avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Une dent bifide au milieu de l'échancrure du menton. Corselet le plus souvent court et presque transversal, toujours peu convexe, presque carré, peu ou point rétréci postérieurement. Élytres assez allongées, parallèles et peu convexes.

Ce genre, bien distinct et adopté maintenant par tous les entomologistes, a été établi par Ziegler sur le *Carabus Littoralis* de Duftschmid.

Les *Pogonus* sont de petits carabiques assez agiles, ordinairement de couleur métallique, quelquefois à élytres jaunâtres, qui présentent tous les caractères suivants :

La lèvre supérieure est assez courte, transversale et coupée carrément à sa partie antérieure. Les mandibules sont peu saillantes, légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand, légèrement concave, fortement échancré, et il a une assez forte dent, bien distinctement bifide au milieu de son échancrure. Les palpes sont peu saillans; leurs articles sont presque égaux; le dernier est assez allongé, un peu renflé, légèrement ovulaire et terminé presque en pointe. Les antennes sont à peu près de la longueur de la tête et du corselet réunis, quelquefois un peu plus courtes, quelquefois un peu plus longues; le premier article est assez gros, assez long et cylindrique; le second est également cylindrique, mais moins gros et plus court; le troisième est de la longueur

du premier, et il va en grossissant vers l'extrémité; le quatrième est de la forme du troisième, mais il est plus court; les suivans sont à peu près de la longueur du quatrième, légèrement comprimés, en carré allongé dont les angles sont arrondis, et ils vont un peu en grossissant vers l'extrémité; le dernier est un peu plus long et en ovale allongé. La tête est assez avancée et presque triangulaire. Les yeux sont saillans et assez gros, ce qui fait paraître la tête rétrécie postérieurement. Le corselet est ordinairement plus ou moins court et presque transversal, toujours peu convexe, presque carré, peu ou point rétréci postérieurement. Les élytres sont assez allongées, presque parallèles, peu convexes et arrondies à l'extrémité. Les pattes sont assez courtes. Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées. Les articles des tarses sont assez allongés et très-légèrement triangulaires; les deux premiers des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles: le premier presque en forme de trapèze échancré à son extrémité; le second en forme de cœur dont la partie intérieure est beaucoup plus saillante que l'extérieure. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous.

Les *Pogonus* se trouvent exclusivement aux bords de la mer et des eaux salées; le nom de *Halophilus*, donné par M. Germar à l'une des espèces, peut convenir à toutes.

Elles habitent le Cap de Bonne-Espérance, l'Amérique septentrionale, et surtout l'Europe et la Sibérie.

1. P. PALLIDIPENNIS.

Pl. 105. fig. 1.

Viridi-æneus; thorace quadrato, postice subcoarctato; elytris flavo-pallidis; æneo-micantibus, elongatis, parallelis, striato-punctatis, punctisque tribus impressis; pedibus flavo-pallidis.

DEJ. Spec. III. p. 7. n° 1.

P. Maculipennis. DEJ. Cat. p. 9.

Long. $3 \frac{1}{4}$, $3 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $1 \frac{1}{3}$, $1 \frac{1}{2}$ ligne.

Un peu plus grand que le *Littoralis*, et d'une forme presque absolument semblable.

Tête d'un vert bronzé, avec les antennes d'une couleur roussâtre assez claire, et les mandibules d'un brun obscur.

Corselet de la couleur de la tête et un peu moins rétréci postérieurement que celui du *Littoralis*.

Élytres d'un jaune pâle, quelquefois un peu roussâtre, avec un léger reflet bronzé, principalement au milieu, qui y forme quelquefois une grande tache dorsale légèrement obscure, et forme alors à l'extrémité une tache commune presque en croissant un peu plus pâle que le reste des élytres; le fond des stries légèrement bronzé.

Dessous du corps d'un vert-bronzé assez brillant, avec les pattes d'un jaune-pâle un peu roussâtre.

Il se trouve communément dans le midi de la France, sur les bords de la Méditerranée.

2. P. FLAVIPENNIS.

Pl. 103. fig. 2.

Viridi-æneus; thorace quadrato, postice subcoarctato; elytris flavo-pallidis, æneo-micantibus, subelongatis, oblongo-ovatis, striato-punctatis, punctisque tribus impressis; pedibus flavo-pallidis.

DEJ. Spec. III. p. 8. n° 2.

P. Pallidipennis. DEJ. Cat. p. 9.

P. Latipennis. ULLRICH.

Long. 5, 5 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$ ligne.

Ressemble beaucoup au *Pallidipennis*, mais un peu plus petit et d'une forme un peu différente.

Corselet un peu plus rétréci postérieurement.

Élytres proportionnellement un peu plus courtes, un peu plus larges, moins parallèles, plus ovales et un peu plus planes.

Il se trouve en Espagne, où il a été pris autrefois par M. Dejean, et aux environs de Trieste.

3. P. LURIDIPENNIS. Germar.

Pl. 103. fig. 3.

Viridi-æneus, nitidus; thorace subtransverso, postice coarctato; elytris flavo-pallidis, æneo-micantibus, breviori-

bus, subparallelis, striato-punctatis, punctisque tribus impressis; pedibus flavo-pallidis.

DEJ. Spec. III. p. 9. n° 5.

Harpalus Luridipennis. AHRENS. *Fauna Ins. Europ.* VII.

T. 3.

Long. 3, 3 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 1 $\frac{1}{3}$, 1 $\frac{2}{3}$ ligne.

Ressemble aussi beaucoup au *Pallidipennis*; mais ordinairement un peu plus petit et d'une forme entièrement différente.

Tête et corselet d'un vert-bronzé plus clair et plus brillant.

Corselet un peu plus court, presque transversal, plus large antérieurement et plus rétréci postérieurement.

Élytres un peu plus courtes, plus larges et presque ovales, également d'un jaune pâle, quelquefois un peu roussâtre, avec un léger reflet bronzé, ne s'apercevant guère que dans le fond des stries, et ne formant pas ordinairement une tache obscure au milieu des élytres, comme dans le *Pallidipennis*.

Il se trouve près des lacs salés, en Allemagne et en Sibérie, et sur les bords de la mer dans le nord de la France et en Angleterre.

4. P. FULVIPENNIS.

Pl. 103. fig. 4.

Obscure æneus; thorace subtransverso, postice subcoarctato; elytris testaceis, æneo-micantibus, brevioribus, subparal-

telis, striato-punctatis, punctisque tribus impressis; pedibus flavo-pallidis.

DEJ. Spec. v. Suppl. p. 702. n° 19.

Bembidium Fulvipenne. STURM.

Long. $2 \frac{1}{3}$ lignes. Larg. 1 ligne.

Ressemble beaucoup à l'*Iridipennis*, mais un peu plus petit et proportionnellement un peu moins allongé.

Tête et corselet d'un vert-bronze très-obscur et presque noirâtre.

Corselet un peu plus court, un peu moins arrondi sur les côtés antérieurement et un peu moins rétréci postérieurement.

Élytres un peu plus courtes, d'un jaune testacé recouvert d'un très-léger reflet bronzé, striées et ponctuées à peu près de la même manière.

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans l'*Iridipennis*.

Il se trouve en Italie.

5. P. IRIDIPENNIS.

Pl. 103. fig. 5.

Æneus; thorace subtransverso, postice subcoarctato; elytris flavo-obscuris, æneo-micantibus, brevioribus, subparallelis, striato-punctatis, punctisque tribus impressis; pedibus flavo-pallidis.

DEJ. Spec. III. p. 10. n° 5.

NICOLAI. Dissert. Halensis. p. 16. n° 5.

P. Brevicollis. MANNERHEIM.

Long. $2 \frac{1}{2}$, 3 lignes. Larg. 1, $1 \frac{1}{4}$ ligne.

Ressemble par la forme au *Luridipennis*, mais plus petit.

Tête et corselet d'une couleur bronzée un peu verdâtre, moins obscure que dans le *Littoralis*.

Corselet presque transversal comme celui du *Luridipennis*, mais moins arrondi antérieurement, et un peu moins rétréci postérieurement.

Élytres ayant à peu près la même forme, d'un jaune obscur recouvert d'une teinte bronzée plus ou moins marquée.

Il se trouve communément sur les bords des lacs salés de la Saxe; il se trouve aussi en Sibérie et au Caucase.

6. P. LITTORALIS. Megerle.

Pl. 103. fig. 6.

Obscure æneus; thorace quadrato, postice subcoarctato; elytris elongatis parallelis, striato-punctatis, punctisque tribus impressis; pedibus rufo-æneis.

DEJ. Spec. III. p. 11. n° 6.

DEJ. Cat. p. 9.

Carabus Littoralis. DUFTSCHMID. II. p. 183. n° 247.

Platysma Littoralis. STURM. V. p. 67. n° 17. T. 115.
fig. a. A.

Carabus Pilipes. GERMAR. Reise nach Dalmat. p. 193.
n° 73.

Long. $2\frac{3}{4}$, $5\frac{1}{4}$ lignes. Larg. 1, $1\frac{1}{4}$ ligne.

Plus petit que l'*Harpalus Æneus*, proportionnellement plus étroit et entièrement d'une couleur bronzée obscure, quelquefois un peu verdâtre, quelquefois un peu cuivreuse.

Tête assez grande, presque triangulaire, légèrement convexe, avec les mandibules noirâtres.

Corselet plus large que la tête, presque carré, moins long que large, presque transversal, un peu arrondi sur les côtés antérieurement, légèrement rétréci postérieurement; légèrement convexe, presque lisse, avec la base fortement ponctuée, le bord antérieur presque coupé carrément.

Élytres plus larges que le corselet, deux fois aussi longues que larges, presque parallèles, très-légèrement convexes et arrondies à l'extrémité, ayant chacune neuf stries peu enfoncées, distinctement ponctuées, et le commencement d'une dixième près de la suture; les troisième et quatrième, sixième et septième stries se réunissant deux à deux, et n'allant pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; trois points enfoncés, distincts entre la seconde et la troisième strie.

Dessous du corps un peu plus brillant et un peu plus verdâtre que le dessus.

Pattes assez courtes et d'une couleur roussâtre légèrement bronzée.

Il se trouve très-communément sur les bords de la Méditerranée, en France et en Dalmatie.

7. P. HALOPHILUS. Germar.

Pl. 104. fig. 1.

Aeneus; thorace quadrato, postice subcoarctato; elytris subelongatis, suboblongo-ovalis, striato-punctatis, striis externis obsoletis, punctisque tribus impressis; pedibus rufis, æneo-micantibus.

DEJ. Spec. III. p. 13. n° 7.

NICOLAI. Dissert. Halensis. p. 16. n° 1.

AHRENS. Fauna Ins. Europ. x. t. 1.

P. Oceanicus. DEJ. Cat. p. 9.

P. Hispanicus. DEJ. Cat. p. 9.

Carabus Chalceus. MARSHAM. Entom. Britan. I. p. 460. n° 75.

Long. $2\frac{3}{4}$, $3\frac{1}{4}$ lignes. Larg. $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$ ligne.

Ressemble beaucoup au *Littoralis*, mais ordinairement plus petit et d'une forme différente, d'une couleur bronzée, quelquefois verdâtre et assez brillante, quelquefois un peu cuivreuse, quelquefois obscure et presque noire, avec les antennes proportionnellement un peu plus longues.

Corselet un peu moins rétréci postérieurement.

Élytres un peu moins allongées, proportionnellement un peu plus larges, moins parallèles et presque ovales; leurs stries un peu moins marquées, surtout vers l'extrémité;

les sixième et septième beaucoup moins marquées et quelquefois presque entièrement effacées.

Les pattes ordinairement d'une couleur plus roussâtre et moins bronzée.

Il se trouve communément en Saxe, sur les bords des lacs salés; en Angleterre, en France, sur les bords de l'Océan et sur ceux de la Méditerranée.

8. P. VIRIDANUS.

Pl. 104. fig. 2.

Viridi-æneus; thorace quadrato, postice subcoarctato; elytris subelongatis, suboblongo-ovatis, striato-punctatis, striis externis obsoletis, punctisque tribus impressis; pedibus rufis.

DEJ. *Spec.* III. p. 14. n° 8.

P. *Dubius.* DEJ. *Cat.* p. 9.

Long. $5 \frac{1}{4}$, 7 lignes. Larg. $1 \frac{1}{2}$, ligne.

Ressemble beaucoup à l'*Halophilus*, dont il n'est peut-être qu'une variété, mais un peu plus grand et d'une couleur bronzée plus claire et presque verte.

Corselet un peu moins convexe.

Pattes d'un jaune roussâtre.

Il se trouve en Sicile; et M. Dejean en a pris autrefois un individu en Espagne.

9. P. GILVIPES.

Pl. 104. fig. 3.

Obscure cupreo-æneus; thorace quadrato, postice subcoarctato; elytris subelongatis, subparallelis, profunde striato-punctatis, punctisque quinque impressis, pedibus flavo-pallidis.

DEJ. *Spec.* III. p. 14. n° 9.

P. Flavipes. ULLRICH. STURM. *Cat.* p. 186.

P. Pallipes. SCHUPPEL.

Long. $2\frac{1}{2}$, 3 lignes. Larg. 1, $1\frac{1}{4}$ ligne.

Ressemble par la forme au *Littoralis*, mais ordinairement plus petit; d'une couleur bronzée obscure, un peu cuivreuse, avec les palpes et les antennes entièrement d'un jaune roussâtre.

Élytres proportionnellement un peu moins allongées et un peu moins parallèles; leurs stries plus fortement marquées et plus fortement ponctuées; cinq points enfoncés distincts entre la seconde et la troisième strie.

Il se trouve sur les bords de la Méditerranée, dans le midi de la France et aux environs de Trieste.

10. P. RIPARIUS.

Pl. 104. fig. 4.

Obscure æneus; thorace quadrato, antice subangustato, postice non coarctato; elytris subelongatis, oblongo-ovatis,

striato-punctatis, striis externis obsoletis, punctisque tribus impressis; pedibus rufo-æneis.

DEJ. Spec. III. p. 16. n° 11.

DEJ. Cat. p. 9.

Long. 3, 3 $\frac{1}{2}$ lignes. Larg. 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$ ligne.

A peu près de la grandeur du *Littoralis*, mais d'une forme entièrement différente; d'une couleur bronzée quelquefois un peu cuivreuse, quelquefois obscure et presque noirâtre, avec les antennes proportionnellement un peu plus longues.

Corselet plus large, un peu rétréci antérieurement, un peu sinué sur les côtés près de la base, mais nullement rétréci postérieurement.

Élytres un peu moins allongées, plus larges, moins parallèles et plus ovales; leurs stries un peu moins marquées surtout vers l'extrémité; les sixième et septième quelquefois presque entièrement effacées; trois points enfoncés distincts entre la seconde et la troisième strie.

Il se trouve communément sur les bords de la Méditerranée, dans le midi de la France, en Dalmatie et en Crimée.

11. P. ORIENTALIS.

Pl. 104. fig. 5.

Æneus; thorace subtransverso, postice non coarctato; elytris brevioribus, oblongo-ovatis, striato-punctatis, striis

externis obsoletis, punctisque tribus impressis; pedibus rufo-æneis.

DEJ. *Spec.* III. p. 16. n° 12.

DEJ. *Cat.* p. 9.

Long. $3 \frac{1}{4}$ lignes. Larg. $1 \frac{1}{3}$ ligne.

Ressemble un peu au *Riparius* par la taille et la couleur, mais d'une forme un peu différente.

Corselet un peu plus court, presque transversal, un peu moins rétréci antérieurement, un peu moins sinué sur les côtés près de la base.

Élytres un peu plus courtes, plus larges et plus ovales; striées et ponctuées à peu près de la même manière.

Dessous du corps d'un bronzé un peu verdâtre.

Pattes d'une couleur roussâtre légèrement bronzée.

Il se trouve dans la Russie méridionale.

12. P. MERIDIONALIS.

Pl. 104. fig. 6.

Nigro-æneus; thoraceque quadrato, antice subangustato, postice non coarctato; elytris subelongatis, oblongo-ovatis, striato-punctatis, interstitiis alternatim punctatis; pedibus rufo-æneis.

DEJ. *Spec.* III. p. 17. n° 15.

Long. $2 \frac{3}{4}$, $3 \frac{1}{4}$ lignes. Larg. $1 \frac{1}{4}$, $1 \frac{1}{2}$ ligne.

Un peu plus petit que le *Riparius*, et d'une forme un peu plus étroite. D'une couleur bronzée obscure et un

peu noirâtre, assez brillante dans les mâles, plus terne dans les femelles.

Corselet à peu près de la même forme, seulement un peu plus convexe et un peu plus étroit.

Élytres un peu plus étroites, striées de la même manière; les sixième et septième stries aussi marquées que les autres; cinq à sept points enfoncés, distincts, entre la seconde et la troisième strie; deux à quatre points entre la quatrième et la cinquième, et deux ou trois entre la sixième et la septième.

Dessous du corps d'un vert-bronzé obscur.

Pattes d'une couleur roussâtre légèrement bronzée avec les cuisses quelquefois presque entièrement d'un vert bronzé.

Il se trouve communément dans le midi de la France sur les bords de la Méditerranée.

13. P. PUNCTULATUS.

Pl. 105. fig. 1.

Nigro-æneus; thorace quadrato, antice subangustato, postice non coarctato; elytris subelongatis, oblongo-ovatis, striato-punctatis, striis externis obsoletis, interstitiis tertio septimoque punctatis; pedibus rufo-æneis.

DEL. Spec. III. p. 18. n° 14.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. 1 ligne.

Ressemble beaucoup au *Meridionalis*, et à peu près de la même forme et de la même couleur, mais beaucoup

plus petit, avec les antennes presque entièrement roussâtres.

Élytres avec les stries un peu moins marquées, surtout vers l'extrémité; les sixième et septième quelquefois presque entièrement effacées; les troisième et septième intervalles ponctués à peu près de la même manière; mais l'extrémité du cinquième sans aucun point enfoncé.

Dessous du corps et pattes comme dans le *Meridionalis*.
Il se trouve au Caucase.

14. P. GRACILIS.

Pl. 105. fig. 2.

Obscure viridi-æneus; thorace quadrato, postice subcoarctato; elytris subelongatis, subparallelis, striato-punctatis, punctisque tribus impressis; pedibus rufis.

DEJ. Spec. III. p. 18. n° 15.

P. Pygmæus. ULLRICH. STURM. Cat. p. 186.

Long. 2, 2 $\frac{1}{4}$ lignes. Larg. $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ ligne.

Ressemble un peu au *Gilvipes*, mais plus petit et proportionnellement plus étroit et d'un vert-bronzé obscur en dessus, avec les antennes d'un jaune roussâtre.

Corselet un peu plus long, un peu plus large, moins transversal et moins convexe.

Élytres plus étroites, les stries assez fortement ponctuées; trois points enfoncés peu distincts, entre la seconde et la troisième strie.

Dessous du corps d'une couleur bronzée obscure, avec les pattes d'un jaune roussâtre.

Il se trouve sur les bords de la Méditerranée, en France et aux environs de Trieste.

15. P. RUFÆNEUS. Gebler.

Pl. 105. fig. 3.

Obscure viridi-æneus; thorace quadrato, postice non coarctato; elytris flavo-obscuris, æneo-micantibus, subelongatis, subparallelis, striato-punctatis, punctisque tribus impressis; pedibus rufis.

DEJ. Spec. III. p. 19. n° 16.

Long. $2\frac{1}{4}$ lignes. Larg. $\frac{3}{4}$ ligne.

Ressemble au *Gracilis*, mais ordinairement un peu plus grand, avec les palpes, les antennes et les pattes également d'un jaune roussâtre.

Tête et corselet d'un vert-bronzé un peu moins obscur.

Corselet un peu plus large et moins rétréci postérieurement.

Élytres d'un jaune obscur, avec un reflet d'un vert bronzé quelquefois très-marqué sur la suture vers la base; les stries assez fortement marquées et légèrement ponctuées; trois points enfoncés bien distincts entre la seconde et la troisième strie.

Dessous du corps d'une couleur bronzée obscure, avec l'extrémité de l'abdomen un peu roussâtre.

Il se trouve en Sibérie.

16. P. TESTACEUS.

Pl. 105. fig. 4.

Testaceus, æneo-micans; thorace plano, quadrato, postice non coarctato; elytris elongatis, parallelis, striatis, striis subpunctatis, punctisque tribus impressis.

DEJ. *Spec.* III. p. 20. n° 17.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $\frac{3}{4}$ ligne.

Ressemble par la forme aux deux espèces précédentes, mais un peu plus grand et moins convexe, et entièrement en dessus d'un jaune testacé, avec un reflet bronzé plus ou moins marqué, toujours assez fortement sur la tête et quelquefois sur le corselet.

Corselet assez grand, très-légèrement convexe, presque carré, un peu sinué sur les côtés près de la base, mais point rétréci postérieurement.

Élytres presque planes, allongées, parallèles, guère plus larges que le corselet; les stries assez fortement marquées, très-légèrement ponctuées, trois points enfoncés, peu distincts entre la seconde et la troisième strie.

Dessous du corps d'une couleur un peu plus obscure que le dessus, avec les pattes au contraire un peu plus pâles.

Il se trouve assez communément dans le midi de la France, sur les bords de la Méditerranée.

17. P. FILIFORMIS.

Pl. 105. fig. 5.

Elongatus, obscure viridi-æneus; thorace elongato-quadrato, postice non coarctato; elytris elongatis, parallelis, striatis, striis subpunctatis, punctisque tribus impressis; pedibus rufis.

DEJ. Spec. III. p. 21. n° 18.

Sirdenus Filiformis. ZIEGLER.

Long. $2 \frac{1}{2}$ lignes. Larg. $\frac{1}{2}$ lignes.

A peu près de la longueur du *Testaceus*, mais beaucoup plus étroit et d'un vert-bronze obscur.

Tête assez grosse, légèrement convexe, lisse, avec un enfoncement de chaque côté entre les antennes, et les mandibules roussâtres; les antennes de la même couleur.

Corselet un peu plus large que la tête, un peu plus long que large, presque carré, un peu sinué sur les côtés près de la base, mais point rétréci postérieurement, et très-légèrement convexe.

Élytres à peu près de la largeur du corselet, allongées, parallèles; les stries assez fortement marquées et légèrement ponctuées; trois points enfoncés distincts placés entre la seconde et la troisième strie.

Dessous du corps d'un brun noirâtre un peu bronzé, avec les pattes d'un jaune roussâtre.

Il se trouve en Sardaigne, d'où il a été rapporté par Dahl.