

www.e-rara.ch

Tome second.

XII. Taphria.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

Les palpes sont un peu plus allongés, surtout le dernier article, qui est presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles sont un peu plus allongés, surtout le premier; le second et le troisième sont un peu plus triangulaires et moins cordiformes.

P. AMERICANA.

Pl. 115. fig. 1.

Nigro-picca; thorace rotundato; elytris oblongo-ovatis, subconvexis, profunde striatis, punctisque duobus impressis; antennis pedibusque rufis.

DEJ. Spec. III. p. 85. n° 1.

Long. $4 \frac{3}{4}$ lignes. Larg. 2 lignes.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale.

XII. TAPHRIA. Bonelli.

SYNUCHUS. Gyllenhal. AGONUM. Sturm.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les mâles. Crochet des tarses dentelés en dessous. Dernier article des palpes labiaux assez fortement sécuriforme dans les deux sexes. Antennes filiformes et assez

allongées. Lèvre supérieure en carré moins long que large et presque transversale. Mandibules peu avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Une dent bifide au milieu de l'échancrure du menton. Corselet ovalaire, arrondi postérieurement. Élytres en ovale allongé, et légèrement convexes.

Bonelli a établi ce genre sur le *Carabus Vivalis* d'Illiger, et Gyllenhal presque en même temps lui avait donné le nom de *Synuchus*; mais le nom de *Taphria* a été généralement adopté.

L'espèce unique qui forme ce genre a quelques rapports avec certaines espèces d'*Agonum* exotiques; mais elle présente des caractères génériques bien marqués.

La lèvre supérieure est très-légèrement convexe, en carré moins long que large, presque transversale et coupée carrément à sa partie antérieure. Les mandibules sont peu avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand, légèrement concave, fortement échancré, et il a une dent très-distinctement bifide au milieu de son échancrure. Les palpes sont assez grands; le dernier article des maxillaires est assez allongé, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité; celui des labiaux est un peu plus court, un peu renflé, fortement sécuriforme dans les deux sexes, et tronqué obliquement à l'extrémité. Les antennes sont filiformes, et à peu près de la longueur de la moitié du corps; leurs articles sont assez allongés et presque cylindriques: le second est plus court que tous les autres, et le troisième n'est pas sensiblement plus long que les suivans. La tête est presque triangulaire, et un peu rétrécie postérieurement. Les yeux sont

assez saillans. Le corselet est ovalaire et arrondi postérieurement. Les élytres sont en ovale allongé et légèrement convexes. Les pattes sont assez fortes et peu allongées. Les jambes antérieures sont assez fortement échan-crées. Les articles des tarsees sont assez allongés, presque cylindriques ou légèrement triangulaires; les trois premiers des tarsees antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles, et à peu près de la même longueur: le premier est triangulaire et les deux suivans assez fortement cordiformes.

T. VIVALIS.

Pl. 115. fig. 2.

Nigro-picea; thorace subrotundato; elytris oblongo-ovatis, striatis, punctisque duobus impressis; antennis pedibusque rufis.

DEJ. *Spec.* III. p. 85. n° 1.

DEJ. *Cat.* p. 10.

Carabus Vivalis. ILLIGER. *Käfer Preus.* I. p. 197. n° 79.

DUFTSCHMID. II. p. 140. n° 183.

Synuchus Vivalis. GYLLENHAL. II. p. 77. n° 1. et IV. p. 424. n° 1.

SAHLBERG. *Dissert. entomol. Ins. Fennica.* p. 216. n° 1.

Agonum vivale. STURM. V. p. 215. n° 22.

Carabus Rotundatus, var. b. SCH. *Syn. Ins.* I. p. 214. n° 258.

Long. 3, 3 $\frac{3}{4}$ lignes. Larg. 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$ ligne.

Ressemble beaucoup par la forme à l'*Olisthopus Rotundatus*, mais un peu plus grande et d'un brun plus ou moins foncé, souvent assez noir et quelquefois assez clair.

Tête très-légèrement convexe, presque lisse, avec les antennes d'un rouge ferrugineux.

Corselet plus large que la tête, un peu moins long que large, arrondi sur les côtés, assez convexe, presque lisse, avec les bords latéraux un peu roussâtres.

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé, légèrement convexes, ayant chacune neuf stries et le commencement d'une dixième près de l'écusson; les troisième et quatrième, cinquième et sixième se réunissant deux à deux, et n'allant pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; ordinairement deux points enfoncés distincts sur le troisième intervalle près de la seconde strie; une rangée de points fortement marqués le long du bord extérieur.

Dessous de l'abdomen d'un brun ferrugineux, avec le corselet et la poitrine d'un brun noirâtre.

Pattes d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve sous les pierres, les mousses et les feuilles sèches, particulièrement dans les bois et les montagnes, en Suède, en Angleterre, en France, en Suisse, en Allemagne et en Russie.