

www.e-rara.ch

Tome second.

XXIV. Drimostoma.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [\[Link\]](#)

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [\[Link\]](#)

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [\[Link\]](#)

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [\[Link\]](#)

que de la largeur des élytres à sa base. Les élytres sont peu allongées, plus larges à leur base, et elles vont en diminuant vers l'extrémité, qui est arrondie. Les pattes sont peu allongées. Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées. Les articles des tarses sont assez allongés, presque cylindriques ou très-légèrement triangulaires; les trois premiers des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles et triangulaires ou cordiformes : le premier est un peu plus grand que les autres. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous.

A. GAGATES.

Pl. 125. fig. 2.

Niger; thorace subquadrato; elytris oblongo-ovatis, ad basin latioribus, striatis, punctoque unico impresso.

DEJ. Spec. III. p. 197. n° 1.

Il se trouve au Sénégal et à la côte de Guinée.

XXIV. DRIMOSTOMA.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les mâles, aussi longs que larges, triangulaires ou cordiformes. Dernier article des palpes extérieurs cylindrique et assez allongé; celui des maxillaires terminé presque en pointe; celui des labiaux tronqué à l'extrémité. Antennes assez courtes, presque moniliformes. Lèvre supérieure

presque carrée, légèrement échancrée antérieurement. Mandibules assez saillantes, légèrement arquées et très-aiguës. Menton trilobé; lobe intermédiaire en pointe assez aiguë. Tête triangulaire. Corselet presque carré. Élytres en ovale peu allongé et assez convexes.

M. Dejean a formé ce nouveau genre sur trois espèces des parties équinoxiales de l'Afrique, et il lui a donné le nom de *Drimostoma*, tiré des deux mots grecs *Δρίμως*, pointu, et *Στομα*, bouche.

Ces insectes se rapprochent beaucoup par le *facies* des *Cratocerus*, mais ils appartiennent à cette tribu, et voici les caractères génériques qu'ils présentent.

La lèvre supérieure est plane, presque carrée et légèrement échancrée antérieurement. Les mandibules sont assez avancées, légèrement arquées et très-aiguës. Le menton est assez court, légèrement concave et trilobé; ou, si l'on veut, il est échancré, et il a au milieu de son échancrure une forte dent simple, assez aiguë, qui remonte au niveau des parties latérales. Les palpes extérieurs sont assez saillans; leur dernier article est cylindrique et assez allongé; celui des maxillaires est terminé presque en pointe, et celui des labiaux est tronqué à l'extrémité. Les antennes sont un peu plus courtes que la moitié du corps; le premier article est peu allongé, assez gros et presque cylindrique; les deux suivans sont obconiques et beaucoup plus minces que tous les autres; le second est le plus court de tous; le troisième est à peine aussi long que les suivans; le quatrième est un peu plus gros et plus ou moins obconique; tous les autres sont presque égaux, au

moins aussi larges que le premier, légèrement comprimés et presque en carré, dont les angles sont arrondis; le dernier est terminé en pointe obtuse. Tout le corps est peu allongé. La tête est triangulaire et assez pointue antérieurement. Les yeux sont saillans. Le corselet est presque carré, et dans toutes les espèces connues il a de chaque côté de la base un sillon longitudinal très-marqué. Les élytres sont en ovale peu allongé et assez convexes. Les pattes sont peu allongées et assez fortes pour la grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont fortement échan-crées intérieurement. Les trois premiers articles des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles; le premier est triangulaire et un peu plus long que les deux autres, qui sont assez fortement cordiformes; les articles des tarses intermédiaires et postérieurs sont très-légèrement triangulaires et presque cylindriques. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous.

D. STRIATOCOLLE.

Pl. 125. fig. 3.

Piceum; thorace subtransverso, postice utrinque striato, angulis posticis obtusis; elytris ovatis, profunde striatis, striis punctatis; antennis pedibusque testaceis.

DEJ. Spec. v. Suppl. p. 747. n° 2.

Il se trouve au Sénégal et aux Indes orientales.

XXV. MICROCEPHALUS. Latreille.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les mâles, aussi longs que larges et fortement triangulaires ou cordiformes. Dernier article des palpes peu allongé et assez fortement sécuriforme. Antennes filiformes et assez allongées. Lèvre supérieure en carré moins long que large et légèrement échancrée antérieurement. Mandibules peu avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Menton trilobé; lobe intermédiaire arrondi. Corselet presque carré, aussi large que les élytres à sa base. Élytres assez allongées, très-légèrement ovales et presque parallèles.

Ce genre a été formé par Latreille sur un insecte du Brésil, qui ressemble, à la première vue, aux *Abax* de Bonelli, mais qui présente des caractères génériques bien distincts.

La lèvre supérieure est en carré moins long que large et légèrement échancrée antérieurement. Les mandibules sont peu avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand, légèrement concave et trilobé; ou, si l'on veut, il est assez fortement échancré, et le milieu de l'échancrure est arrondi et s'avance presque au niveau des parties latérales. Les articles des palpes sont peu allongés; le dernier est assez fortement sécuriforme dans les deux sexes; celui des labiaux l'est beaucoup plus que celui des maxillaires. Les antennes sont filiformes et au plus de la longueur de la moitié du corps; leurs articles sont presque cylindriques; le premier est un

peu plus gros que les autres; le second est le plus court de tous; le troisième est un peu plus long que les suivans, qui sont égaux entre eux et légèrement comprimés. La tête est assez allongée, presque ovale et point rétrécie postérieurement. Les yeux sont arrondis et assez saillans. Le corselet est presque carré, un peu rétréci antérieurement et aussi large que les élytres à sa base. Les élytres sont assez allongées, très-légèrement ovales et presque parallèles. Les pattes sont peu allongées. Les jambes antérieures sont allongées, presque cylindriques ou très-légèrement triangulaires et bifides à l'extrémité; les trois premiers des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles; le premier est triangulaire et plus grand que les deux autres, qui sont assez fortement cordiformes. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous.

M. DEPRESSICOLLIS.

Pl. 125. fig. 4.

*Supra cyaneo-violaceus; thorace subquadrato, trisulcato;
elytris oblongo-ovatis, subsulcatis.*

DEJ. Spec. III. p. 199. n° 1.

Il se trouve au Brésil.

