

www.e-rara.ch

Flora Taurico-Caucasica

Marschall von Bieberstein, Friedrich August

Charkoviae (Kharkov), 1808-1819

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 3542

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-17996>

Monadelphia.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

356. ERODIUM. Calyx 5-phyllus. Cor. 5-petala. Nectarium: squamulae 5, staminibus interjectae, glandulae melliferae infidentes. Arilli 5, monospermi, aristati, receptaculo rostrato affixi: aristis spiralibus, introrsum barbatis.

* *Foliis compositis pinnatis pinnatifidisque.*

1334. ERODIUM *anthemifolium*.

E. pedunculis multifloris calycibusque submuticis villosis, foliis interrupte pinnatis canescentibus: pinnis pinnatifidis, laciniis oblongis acutiusculis sublobatis; petalis subemarginatis calyce longioribus, caule ramoso diffuso.

Habitat in Iberiâ occidentali. D. Steuen. 2

Planta facie E. ciconii pube breviori mollioreque incana, magis ramosa et diffusa foliisque magis dissectis: Pedunculi 5-10-flori: pedicellis elongatis divaricatis. Flores magnitudine E. ciconii. Calycina foliola 3 aristâ brevissimâ, 2 omnino mutica. Petala calyce duplo fere majora lata obtusa subemarginata caerulescentia: nervis saturatioribus. Stipulae tam caulibus quam petiolorum parvae acutae marciduae. Foliorum formâ etiam ad E. alpinum accedit: sed et ab hoc pube omnium partium et calycibus submuticis diversum.

1335. ERODIUM *ciconium*.

E. pedunculis multifloris, foliis pinnatis: pinnis pinnatifidis dentatis, petiolo communi inter pinnas dentato, petalis oblongis obtusis: binis emarginatis, caule ascendente. Linn. ed. Willd. 3. p. 629.

Geranium ciconium. *Cavan. diff.* 4. p. 228. t. 95. f. 2.
Jacq. hort. vind. 1. t. 18. *Hall. hist. n.* 946. *Pall. ind. taur.*

Frequens in sterilibus incultis, tam Tauriae quam ad
 Caucaſum. Floret Aprili, Majo. ☉

Variat maxime ramiſſitate, foliis, florum numero et ma-
 gnitudine. In arenâ mobili deſerti Cumani legi *varietatem* prae-
 cocem foliis oblongis lobatis: lobis dentatis, ſcapo radicali 1-
 2-floro, floribus minoribus; quam pro peculiari ſpecie facile
 haberes, niſi indiuiduis intermediis conjungeretur cum princi-
 pali.

1336. ERODIUM *Steueni.*

E. pedunculis ſubtriſſoris, foliis interrupte pinnatis nudi-
 ſculis: pinnis bipinnatiſidis, laciniis linearibus; petalis oblongis
 obtuſis calyce duplo longioribus, caule incano diſſuſo.

Occurrit in promontorio caucaſico, circa Stauropolin. 2

Caulis ramiſſiſſimus diſſuſus baſi villoſulus ſuperne tantum
 incanus purpureus. *Folia* pallide virentia vix pubeſcentia tenu-
 iſſime laciniata: lacinulis anguſtis. *Pedunculi* ſubtriſſori incani.
Calyx magnitudine *E. cicutarii*: foliolis ariſtâ lineam longâ.
Petala ovato-oblonga obtuſa calyce duplo longiora.

1337. ERODIUM *cicutarium.*

E. pedunculis multiſſoris, foliis pinnatis: pinnis pinnatiſi-
 dis inciſis, corollis calyce majoribus, caule hirta proſtrato.
Linn. ed. Willd. 3. p. 629.

Geranium cicutarium. *Curt. lond. Hall. hiſt. n.* 944.
Gmel. ſib. 3. p. 275. n. 8. *Pall. ind. taur.*

G. chaerophyllum. *Cavan. diff.* 4. p. 226. t. 95. f. 1.

Commune in incultis. Floret Majo et hinc inde ſero
 autumnno. ☉

** *Foliis lobatis et indivisis.*

1338. *ERODIUM oxyrhynchum.*

E. pedunculis subtrifloris, foliis cordatis oblongis subtripartitis crenatis subtus incanis: lobo extimo trifido, caule prostrato, aristis filiformibus longissimis.

Geranium nodosum acu longissimâ. *Buxb. cent. 2. p. 41. t. 48.*

Habitat in Iberiae orientalis collibus siccis, ad Cyrum fluvium. 2

Planta pube exili subcanescens minime hirsuta. *Caulēs* prostrati subramosi: geniculis incrassatis, e quibus foliorum fasciculi et pedunculi. *Stipulae* tam caulibus quam pedunculorum subulatae parvae. *Flores* magnitudine E. cicutarii: calycinis foliis aristâ brevis, petalis oblongis obtusis purpurascens calyce longioribus. *Semen* aristâ longissima tenuissima incana. *Facies* E. guttati, a quo differt foliis profundius lobatis cum caule incanis, nec villis albis hirsutis et subtomentosis; caulibus longioribus, stipulis angustioribus et acutioribus, femine aristâ longiore et colore floris.

DECANDRIA.

357. *GERANIUM*. Cal. 5 - phyllus. Cor. 5 - petala, regularis. Nectar. glandulae 5 melliferae, basi longiorum filamentorum adnatae. Arilli 5, monospermi, aristati, receptaculo rostrato affixi: aristis nudis, simplicibus (nec spiralibus, nec barbatis).

* *Pedunculis unifloris.*

1339. *GERANIUM sibiricum.*

G. pedunculis unifloris, caule erecto ramoso, foliis quinquelobo-palmatis: lobis oblongis inciso-dentatis. *Linn. ed.*

Willd. 3. p. 697. *Cavan. diff.* 4. p. 198. t. 77. f. 1. *Burm. ger. n.* 3. *Gmel. fib.* 3. p. 274. n. 2. t. 67. *Jacq. hort. vind.* 1. t. 19.

Occurrit in Iberiâ occidentali. 2

Planta iberica minus villosa est quam sibirica, quoad reliqua simillima. Arilli pilosi. Varietatem pedunculis ex eodem puncto binis ex Iberiâ quoque habeo.

1340. GERANIUM *sanguineum*.

G. pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis. Linn. ed. Willd. 3. p. 697. Cavan. diff. 4. p. 195. t. 76. f. 1. Burm. geran. 3. Hall. hist. n. 930. Gmel. fib. 3. p. 274. n. 1. Pall. ind. taur.

Commune in syluaticis montosis. Floret a Majo, per totam aetatem. 2

** *Pedunculis bifloris: perennia.*

1341. GERANIUM *radicatum*. (*tuberosum L.*)

G. pedunculis bifloris, foliis multipartitis: laciniis incisoferratis, caule a basi ad bifurcaturam nudo.

G. (tuberosum) pedunculis bifloris, foliis multipartitis: laciniis linearibus pinnatifidis obtusis. Linn. ed. Willd. 3. p. 698. (exclusis synonymis omnibus.) Pall. ind. taur.

G. radice grumosa. C. B. Moris. hist. 2. p. 515. sect. 5. t. 16. f. 20.

G. septimum. Tabern. Kraeut. p. 124.

Crescit in Tauriae campestribus et in Iberiâ. Floret Aprili. Majo. 2

Folia radicalia segmentis latis pinnatifidis: laciniis sublobatis, floralia segmentis angustis incisoferratis vel tantum ferratis.

1342. GERANIUM *tuberosum*. (*linearilobum* DC.)

G. pedunculis bifloris, foliis multipartitis: laciniis subdiuisis, lacinulis linearibus integerrimis; caule a basi ad bifurcaturam unifolio.

G. pedunculis bifloris, foliis multipartitis: laciniis linearibus subdiuisis obtusis. Linn. hort. cliff. p. 343. Burm. geran. 9.

G. foliis albicantibus multipartitis: laciniis linearibus subpinnatis obtusis, pedunculis binis aut bifloris, petalis emarginatis. Cau. diff. 4. p. 199. t. 78. f. 1. Lamark dict. 2. p. 653. n. 9.

G. tuberosi varietas sibirica. Willd. ed. Linn. 3. p. 698. n. 5. in notâ.

G. tuberosum majus. C. B. Moris. hist. 2. p. 516. sect. 5. t. 16. f. 21.

Habitat in nemorosis sub arboribus, etiam in campestribus ad Wolgam inferiorem minus rarum, quam in promontorio caucasico. Floret Majo. 2

Praecedente plerumque altius. Foliorum radicalium segmenta 2-3-partita lacinulis linearibus integerrimis: caulini et floralium segmenta longiora saepius indiuisa quam bipartita. Affine quidem praecedenti, tamen specie certe distinctum.

1343. GERANIUM *ibericum*.

G. pedunculis bifloris, petalis trilobo-emarginatis, foliis subseptemlobis inciso dentatis, caule villoso. Linn. ed. Willd. 3. p. 702. Caucan. diff. 4. p. 209. t. 124. f. 1. Lamark dict. 2. p. 658. n. 25.

G. orientale batrachioides tenuioribus foliis, flore maximo Tournef. cor. p. 20.

β. foliis minus dissectis: lacinulis minus acuminatis, petalis emarginatis.

G. orientale batrachioides amplioribus foliis, flore maximo.
Tournef. cor. p. 20.

Habitat in Caucaſo iberico alpino. 2

Caulis, *petioli*, *pedunculi* et *calyces* pilis patulis longis mollibus albis hirsutiffimi; *arilli* quoque cum *aristis* hirsuti. *Folia* præter nervos paginae inferioris minus villosa. *Flores* purpureo-caerulei: *calyce* aristis longis, *petalis* magnis bilobis, saepius cum dente intermedio, qui attamen quandoque deest. *Varietas* β rarior *petalis* etiam brevioribus ab α aberrat, vix tamen specie diuerſa.

1344. GERANIUM *sylvaticum*.

G. pedunculis bifloris, foliis subpeltatis quinquelobis inciso-ferratis, caule erecto corymboso, petalis submarginatis.
Linn. ed. Willd. 3. p. 703. Hall. hist. n. 932.

G. secundum batrachioides minus. *Clus. hist. 2. p. 99.*

Occurrit in Caucaſo iberico. 2

Panícula dichotoma multiflora subcorymbosa. *Pedunculi calycesque* pilis confertis patentissimis glanduliferis hispidi: hi aristâ longiusculâ. *Petala* obtusissima submarginata purpurea: venis saturationibus. *Arilli* leniter pubescentes.

G. batrachioides *Cavan. diff. 4. p. 211. t. 85. f. 2* differt ab hoc *calyce* breviori: fructifero ut in subsequente turgidulo, et *arillis* glabris.

1345. GERANIUM. *pratense*.

G. pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis rugosis acutis, petalis integris. *Linn. ed. Willd. 3. p. 795. Cavan. diff. 4. p. 210. t. 87. f. 1. Hall. hist. n. 931.*

G. tertium batrachioides majus. *Clus. hist. 2. p. 100.*

In Albaniâ ibericâ reperitur. 2

Folia præcedente altius et crebrius incisa. *Flores* minus copiosi majores. *Pedunculorum* et *calycum* hirsuties minor. *Petala* rotundata caerulea: venis fanguineis.

1346. GERANIUM *collinum*.

G. pedunculis bifloris calycibusque villoso-viscosis, petalis subrotundis integris calyce longioribus, caule diffuso, foliis palmato-quinquepartitis subtrilobis inciso-ferratis.

G. pedunculis bifloris, foliis subpeltatis septempartitis: lobis laciniatis, caule decumbente, petalis longitudine calycis, calycibus pedunculisque glanduloso-pubescentibus. *Linn. ed. Willd. 3. p. 705.*

Frequens in Caucasi subalpini pratis, ditionibus etiam Wolgensibus et Ucraniae familiare. Floret Julio, Augusto. 2

et in Tauria!
Pili totius plantae prostrati breves: pedunculorum et calycum patuli longiores. Folia fere G. aconitifolii. Flores majores. Calyces aristis longiusculis. Petala calyce paullo longiora ovata rotundata purpureocaerulea. Antherae luteae. Arilli pilosi. Variat florum magnitudine et pilis pedunculorum calycumque brevissimis, ut incani tantum videantur. Sic praesertim in cultu.

1347. GERANIUM *albanum*.

G. pedunculis bifloris elongatis calycibusque hispidis, foliis reniformibus septemlobis: lobis cuneiformibus trifidis laciniis tridentatis, caule flaccido, petalis emarginatis, arillis venoso-rugosis basi pubescentibus.

Crescit in Albaniâ ibericâ, circa pagum Wakiri. D. Steuen. 2

Habitus et folia infrequentis, sed minus ramosum et magis hispidum: pedunculis oppositifoliis pedicellis/que elongatis. Flores magnitudine fere G. collini. Calycis aristae brevissimae, ut in subsequente. Petala purpurea emarginata calyce duplo longiora. Arilli magni testacei venis prominulis rugosi: basi pube exili, apice glabriusculi.

1348. GERANIUM *pyrenaicum*.

G. pedunculis bifloris, foliis reniformibus septemlobis: lobis oblongis obtusis trifidis, laciniis tridentatis; caule erecto ramoso, petalis emarginatis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 708. Cavan. diff. 4. p. 203. t. 79. f. 2. Curt. lond. Burm. geran. 25. Gerard gallopr. p. 434. t. 16. f. 2.*

G. montanum rotundifolium perenne, flore purpureo majori. *Barrel. ic. 40.*

Occurrit in Tauriae montosis: etiam in summo monte Tschaturdag; nec non in Iberiâ. Floret Majo, Junio, in alpinis Augusto. 2

Pubes calycum, pedunculorum et arillorum exilis. *Calyx* aristae minimae. *Arilli* laeves. *Variat petalis* bipartitis et emarginatis.

*** *Pedunculis bifloris: annua.*

1349. GERANIUM *pellens*.

G. pedunculis bifloris, petalis integris calyce duplo longioribus, foliis palmato-quinquepartitis subtrilobis: floralibus superioribus sessilibus, arillis hirsutis.

Habitat in Iberiâ occidentali. *D. Steuen. ☉?*

Habitus flaccidus et *pubes* G. rotundifolii. *Folia* profundius incisa: lobis laciniisque acutioribus, quae *pedunculis* subsunt pleraque sessilia. *Calyx* formâ et pube G. rotundifolii: aristis paullo longioribus. *Petala* duplo saltem majora oblonga obtusa alba aut dilutissime purpurascencia. *Fructus* exacte G. rotundifolii.

1350. GERANIUM *diuvaricatum*.

G. pedunculis bifloris, petalis emarginatis calyce brevioribus, foliis quinquelobis dentatis: lobo unico laterali longiore, arillis scabris superne venoso-rugosis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 709. Waldst. et Kit. rar. hung. 2. t. 123. Ehrh. catal. 7. p. 164.*

G. Winterli Roth. catal. 2. p. 78.

Habitat in Tauriae et Caucaſi nemoribus, inter frutices.
Floret Majo, Junio. ☉

1351. GERANIUM *molle*.

G. pedunculis bifloris, foliis reniformibus: radicalibus nonemlobis, caulinis ſeptemlobis: lobis trifidis, petalis bifidis longitudine calycis mutici, arillis glabris tranſuerſim rugoſis. Linn. ed. Willd. 3. p. 710. Cavan. diff. 4. p. 203. t. 83. f. 3. Flor. dan. t. 679. Curt. lond. Hall. hiſt. n. 939. Leers herb. n. 539. Pall. ind. taur.

G. columbinum villoſum, petalis bifidis purpureis. Vaill. pariſ. t. 15. f. 3.

Creſcit in Tauriae campis apricis, circa Boſphorum. Floret Majo. ☉

1352. GERANIUM *puſillum*.

G. pedunculis bifloris, floribus pentandris, petalis emarginatis longitudine calycis mutici, foliis ſubſeptemlobis trifidis, arillis pubeſcentibus. Linn. ed. Willd. 3. p. 713. Cavan. diff. 4. p. 202. t. 83. f. 1. Burm. geran. 23. Hall. hiſt. n. 940. Leers herb. n. 534.

β. G. humile. Cavan. diff. 4. p. 202. t. 83. f. 2.

G. parviſorum. Curt. lond.

G. columbinum humile, flore minimo caeruleo. Ray ſynopf. ed. 3. p. 359. t. 16. f. 2.

Occurrit in Tauriae et Caucaſi umbroſis. Floret Aprili, Majo. ☉

Dignoſcitur a praecedente ſtaminibus tantum 5 antheriferis et arillis laeuiſus pubeſcentibus, qui huic rugoſi glabri.

1353. GERANIUM *diſſectum*.

G. pedunculis bifloris, foliis quinquepartitis: lobis trifidis linearibus, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis piloſis:

pilis glanduliferis, *Linn. ed. Willd. 3. p. 712. Cau. diff. 4. p. 199. t. 78. f. 2. Curt. lond. Burm. geran. 15. Retz. obs. 1. p. 22. Hall. hist. n. 937. Gmel. fib. 3. p. 275. n. 6. Pall. ind. taur.*

G. columbinum majus, foliis imis usque ad pedunculum diuifis. Vaill. parif. t. 15. f. 2.

Commune in sterilibus. Floret Majo. ☉

Petala fature purpurea. Arilli villosi.

1354. GERANIUM *columbinum.*

G. pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinquepartitis: lobis multifidis linearibus, petalis emarginatis longitudine calycis aristati, arillis glabris laeuibus. Linn. ed. Willd. 3. p. 711. Cauan. diff. 4. p. 200. t. 82. f. 1. Burm. geran. 22. Hall. hist. n. 938. Gmel. fib. 3. p. 275. n. 7. Pall. ind. taur. Habl. taur. p. 154.

G. dissectis foliis, pedunculis longissimis, Vaill. parif. t. 15. f. 4.

In apricis incultis haud rarum. Floret Majo. ☉

Calyx angulatus exquisite aristatus. Petala rosea.

1355. GERANIUM *lucidum.*

G. pedunculis bifloris, foliis quinquelobis rotundatis, calycibus transuerse corrugatis, capsulis multicarinatis. Smith brit. 2. p. 733. Linn. ed. Willd. 3. p. 709. Cauan. diff. 4. p. 214. t. 80. f. 2. Flor. dan. t. 218. Burm. geran. 19. Hall. hist. n. 942. Pall. ind. taur.

G. alterum rotundifolium saxatile montanum. Col. ecphr. p. 138. ic. p. 137.

In petrosis inumbratis Tauriae meridionalis Majo legi. ☉

1356. GERANIUM *robertianum.*

G. pedunculis bifloris, foliis ternatis quinatifque trifido-pinnatifidis, petalis integris calyce aristato duplo longioribus,

arillis reticulatis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 714. Cavan. diff. 4. p. 215. t. 86. f. 1. Flor. dan. t. 694. Curt. lond. Burm. geran. 18. Hall. hist. n. 943. Pall. ind. taur. Habl. taur. p. 154.*

In saxosis umbrosis reperitur. Floret Majo. ♂

1357. GERANIUM *purpureum*.

G. pedunculis bifloris, foliis ternatis quinatisque trifido-pinnatifidis, petalis integris calyce aristato parum longioribus, arillis transuersim rugosis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 715. Vill. delph. 3. p. 374. t. 40.*

Occurrit in Iberiae et Tauriae meridionalis lapidosis. *D. Steuen.* ♂

G. robertiano gracilius magisque *ramosum* et *dinaricatum*, *pubes* minus elongata et mollior, *petala* breviora, *arilli* rugis, *fulcisque* profundioribus.

P O L Y A N D R I A.

358. SIDA. Cal. simplex, angulatus. Stylus multipartitus. Capf. plures mono-S. trispermae.

* *Foliis cordatis dentatis, pedunculis unifloris.*

1358. SIDA *Abutilon*.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis dentatis tomentosis, pedunculis solitariis petiolo brevioribus, capsulis biaristatis truncatis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 750. Cavan. diff. 1. p. 34. n. 73 et 2. p. 49. Kniph. cent. 4. n. 79. Hall. hist. n. 1075.*

Frequens in inundatis ad flumen Terck, circa Kisljar, inter Atriplices et Xanthium. Floret Julio, Augusto. ☉

359. *ALTHAEA*. Cal. duplex: exterior 6-f. 9-fidus. Capf. plurimae, monospermae.

1359. *ALTHAEA officinalis*.

A. foliis tomentosis oblongo-ovatis obsolete trilobis dentatis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 770. Cavan. diff. 2. p. 93. t. 30. f. 2. Flor. dan. t. 530. Hall. hist. n. 1074. Pall. ind. taur.*

Copiosa ad riuulos et fossas. Floret Julio, Augusto. 2

1360. *ALTHAEA cannabina*.

A. foliis tomentoso-scabris: inferioribus palmato-digitatis, summis ternatis: foliolo intermedio longissimo. *Linn. ed. Willd. 3. p. 771. Jacq. austr. 2. p. 1. t. 101. Cavan. diff. 2. p. 94. t. 30. f. 2. Lamark dict. 3. p. 58. n. 2. Pall. ind. taur. Habl. taur. p. 120.*

In pratis montanis, ad sepes et sylvarum margines haud rara. Floret Julio, Augusto. 2

1361. *ALTHAEA hirsuta*.

A. foliis cordatis obtusis quinquelobis supra glabris, caule hirsuto. *Linn. ed. Willd. 3. p. 772. Jacq. austr. 2. p. 44. t. 770. Cavan. diff. 2. p. 95. t. 29. f. 1. Hall. hist. n. 1073. Pall. ind. taur.*

Crescit in agris campisque apricis. Floret aestate. ☉

1362. *ALTHAEA ficifolia*.

A. foliis septemlobo-palmatis obtusis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 174. Cavan. diff. 2. p. 92. t. 28. f. 2.*

Alcea ficifolia. Linn. hort. cliff. 348. Pall. ind. taur. Habl. taur. p. 119.

Malva rosea simplex peregrina. *Tabern. Kraeut. p. 1149.*

Abundat in campis et collibus apricis. Floret a Junio, ad Augustum. ♂

Variat foliis magis et minus profunde lobatis: lobis ovatis et oblongis obtusis. Corolla constanter fulphurea.

360. MALUA. Cal. duplex: exterior triphyllus. Capf. plurimae, monospermae.

* *Foliis angulatis.*

1363. MALUA *rotundifolia.*

M. caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 786. Cavan. diff. 2. p. 79. t. 26. f. 3. Flor. dan. t. 721. Curt. lond. Hall. hist. n. 1070. Pall. ind. taur. Habl. taur. p. 130.*

Communis in ruderatis, ad vias, sepes. Floret aestate. ♀

1364. MALUA *sylvestris.*

M. caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 787. Cavan. diff. 2. p. 78. t. 26. f. 2. Hall. hist. n. 1069. Gmel. sib. 3. p. 276. n. 9.*

Frequens cum praecedente reperitur eodemque tempore floret. ♂

361. LAUATERA. Cal. duplex: exterior trifidus. Capf. plurimae, monospermae.

* *Caule herbaceo.*

1365. LAUATERA *biennis.*

L. caule herbaceo foliisque subtomentosis: inferioribus subrotundis lobatis, floralibus trilobis: medio lanceolato, pedunculis axillaribus solitariis, petalis truncatis subemarginatis.

L. herbacea, foliis inferioribus cordatis crenatis subrotundis lobatis, summis oblongis trilobis: lobo medio maximo, pe-

pedunculis elongatis solitariis, petalis truncatis. *Marsch. casp. p. 183. app. n. 53.*

Habitat in Caucasi orientalis campestribus, versus mare Caspium. Floret aestate. ♂ *Berekey - Derbent*

Dignoscitur ab affini *L. thuringiaca* potissimum petalorum formâ; calycis quoque interioris foliola in longius acumen sunt producta. Arilli transversim subtilissime rugosi.

1366. *LAUATERA thuringiaca.*

L. caule herbaceo tomentoso, foliis subtomentosis: inferioribus angulatis, superioribus trilobis: medio longiore obtuso, pedunculis axillaribus solitariis, petalis obcordatis.

L. thuringiaca. Linn. ed. Willd. 3. p. 795. Jacq. austr. 4. p. 6. t. 311. Cavan. diff. 2. p. 89. t. 31. f. 3. Curt. bot. mag. Dill. elth. f. 8. Pall. ind. taur. Habl. taur. p. 119

Communis in pratis sylvaticis et in dumetis. Floret aestate. ♀

362. *HIBISCUS.* Cal. duplex: exterior polyphyllus. Stigmata 5. Capf. 5-locularis, polysperma.

1367. *HIBISCUS Trionum.*

H. foliis dentatis: superioribus tripartitis, lobis lanceolatis: intermedio longissimo, calycibus inflatis membranaceis nervosis. *Linn. ed Willd. 3. p. 832. Cavan. diff. 3. p. 171. t. 64. f. 1. Curt. bot. mag. Roth. catal. 1. p. 43. 44. Pall. ind. taur. Habl. taur. p. 157.*

Occurrit in Tauriae et Iberiae arvis. Floret Julio, Augusto. ☉